

Verantwoording zorggebruik per aandoening

Definitie van aandoeningen

Op de website wordt extra aandacht besteed aan 6 aandoeningen: diabetes mellitus, depressie, artrose, rugpijn en hart- en vaatziekten.

Voor de definitie van de aandoeningen gebruiken wij ICPC-codes (International Classification of Primary Care-1). Onderstaande tabel geeft weer welke ICPC-codes (uit de ICPC-1-lijst) zijn gebruikt voor het definiëren van patiënten met de aandoening en contacten en medicatie voor de aandoening.

Wij definiëren de 6 geselecteerde aandoeningen als volgt:

Tabel 1. Definitie van de 6 geselecteerde aandoeningen

Aandoening	ICPC-code	Omschrijving ICPC-codes
Artrose	L84, L89, L90 en L91	Artrose/spondylose wervelkolom, coxartrose, gonartrose en andere artrose/verwante aandoening
COPD	R91 en R95	Chronische bronchitis/bronchiëctasieën, emfyseem/COPD
Depressie ¹	P76	Depressie
Diabetes	T90	Diabetes mellitus
Hart- en vaatziekten	K74, K75, K76, K89, K90, K92 en K99	Angina pectoris, acuut myocardinfarct, andere/chronische ischemische hartziekte, passagère cerebrale ischemie/TIA, cerebrovasculair accident (CVA), andere ziekte perifere arteriën, andere ziekte hartvaatstelsel
Rugpijn	L02, L03 en L86	Symptomen of klachten rug, lage rugpijn zonder uitstraling en lage rugpijn met uitstraling

¹In de registratie van eerstelijnspsychologen is depressie gedefinieerd als de hoofddiagnose "stemmingsstoornis" op as 1 van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4^e editie

Incidentie en prevalentie van aandoeningen

De methode van berekening van de incidentie en prevalentie staat [elders](#) op de website uitgebreid beschreven. Incidentie en prevalentie zijn berekend van bovenstaande clusters van ICPC-codes.

Type zorgverleners en aandoeningen

Op de website geven we per aandoening het zorgverbruik bij verschillende type zorgverleners weer. Dit doen we alleen als er een voldoende aantal patiënten met de aandoening bij de betreffende zorgverlener is om over te rapporteren.

Huisarts, huisartsenpost en apotheek

Voor het rapporteren van zorggebruik van patiënten met 1 van de 6 aandoeningen bij de huisartsenpost en bij de apotheek hebben we patiënten geselecteerd op basis van het voorkomen van de aandoening bij de huisarts. We hebben dus gebruik gemaakt van de koppeling tussen [huisarts-huisartsenpost](#) en [huisarts-apotheek](#). Voor zorggebruik op de huisartsenpost zijn alle patiënten geselecteerd met 1 van de 6 aandoeningen waarvan we na konden gaan of deze wel of geen contact had gehad met de huisartsenpost. Voor zorggebruik bij de apotheek zijn alle patiënten geselecteerd die gekoppeld konden worden aan een patiënt in de apotheek. Hieronder vindt u de aantallen patiënten in 2012 waarover gerapporteerd wordt:

Tabel 2. Aantallen patiënten per aandoening bij de huisarts, huisartsenpost en apotheek waarover gerapporteerd wordt

Aandoening	Huisarts¹	Huisartsenpost	Apotheek
Artrose	44.607	18.821	8.531
COPD	25.732	9.347	4.883
Depressie	25.760	10.456	4.578
Diabetes	50.181	20.848	9.445
Hart- en vaatziekten	57.745	32.517	11.909
Rugpijn	73.582	24.206	13.284

¹Dit betreft het aantal unieke patiënten, niet al deze patiënten stonden het gehele jaar ingeschreven bij hun huisarts. Hier is in de analyses rekening mee gehouden.

Eerstelijnspsychologen

We rapporteren over depressie-behandelingen bij de eerstelijnspsycholoog. Hieronder is het aantal behandelingen voor depressie weergegeven waarover gerapporteerd wordt. Het aantal cliënten ligt iets lager dan het aantal behandelingen, omdat het een enkele keer voorkomt dat een cliënt meer dan 1 behandeling volgt in 1 jaar. We rapporteren over aantallen cliënten met een afgesloten behandeling.

Tabel 3. Aantallen depressiebehandelingen bij de eerstelijnspsycholoog waarover gerapporteerd wordt

Jaar	Aantal behandelingen voor stemmingsstoornissen (depressie)	Aantal eerstelijnspsychologen
2009	10.735	650
2010	10.860	613
2011	12.413	583
2012	13.942	543

Voor depressie rapporteren wij ook over prescripties die cliënten met depressie bij de eerstelijnspsycholoog voorgeschreven krijgen door de huisarts. Deze cijfers zijn gebaseerd op de koppeling van gegevens tussen [huisarts en eerstelijnspsycholoog](#). We konden 314 patiënten koppelen uit 82 huisartspraktijken en van 100 eerstelijnspsychologen.

Paramedici

Zorggebruik bij paramedici wordt weergegeven voor onderstaande aandoeningen en voor de onderstaande aantallen patiënten. Voor het rapporteren van zorggebruik van patiënten met 1 van de 6 aandoeningen bij paramedici, worden alle patiënten meegenomen die minimaal één behandelcontact hebben gehad.

Tabel 4. Aantallen patiënten per aandoening bij de diëtist, de fysiotherapeut en de oefentherapeut, waarover gerapporteerd wordt

Type paramedicus	Aandoening	2008	2009	2010	2011	2012
Diëtist	Diabetes	949	1.229	1.226	1.423	1.339
Fysiotherapeut	Artrose	372	357	233	228	178
Fysiotherapeut	Rugpijn	3.442	3.590	2.641	2.200	2.131
Fysiotherapeut	Hart- en vaatziekten	243	265	187	153	143
Oefentherapeut C/M	Artrose	131	148	157	155	106
Oefentherapeut C/M	Rugpijn	1.685	1.653	1.668	1.532	1.179

Bijkomende aandoeningen

Voor elk van de 6 aandoeningen geven wij weer wat de 3 meest voorkomende chronische aandoeningen uit een selectie van 10 chronische aandoeningen zijn. Ook laten wij voor patiënten met 1 van de 6 aandoeningen en 1 of meer chronische aandoeningen het zorggebruik bij de huisarts, de huisartsenpost en de apotheek zien. De tabel hieronder geeft de 10 geselecteerde chronische aandoeningen en hun ICPC-codes zien. Deze selectie is gebaseerd op de lijst van 30 chronische ziekten van [het Nationaal Kompas](#). We hebben uit deze lijst besloten de 10 meest

voorkomende te selecteren, met behoud van de clustering van ICPC-codes zoals we die hanteren voor onze 6 aandoeningen.

Tabel 5. Tien geselecteerde chronische aandoeningen

Chronische aandoening	ICPC-codes
Angststoornissen	P74, P79
Artrose	L84, L89, L90, L91
COPD	R91, R95
Depressie	P76
Diabetes Mellitus	T90
Hart- en vaatziekten	K74, K75, K76, K89, K90, K92, K99
Hartfalen	K77
Kanker	A79, B72, B73, B74, D74, D75, D76, D77, N74, R84, R85, S77, T71, U75, U76, U77, W72, X75, X76, X77, Y77, Y78
Osteoporose	L95
Reumatoïde artritis	L88

Gebruik van meetwaarden bij contacten van diabetespatiënten met de huisartsenpraktijk

Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 kan integraal bekostigd worden. Dit houdt in dat huisartsen voor diabeteszorg een standaardbedrag per patiënt vergoed krijgen. Hierdoor mogen huisartsen niet meer alle losse contacten voor diabetes declareren, wat resulteert in minder geregistreerde contacten met betrekking tot de diabeteszorg en een onderregistratie van het zorggebruik van diabetespatiënten.

Dit heeft gevolg voor:

- Het totaal aantal contacten voor diabetespatiënten
- Het aantal diabetesgerelateerde contacten voor diabetespatiënten

Wij hebben geprobeerd om het aantal contacten voor diabetes zo goed mogelijk bij te schatten door aan diabetes gerelateerde diagnostische metingen of laboratoriumbepalingen mee te tellen als een diabetesgerelateerd contact. Wij tellen alleen diagnostische of laboratoriumbepalingen mee waarvan het aannemelijk is dat deze in de huisartsenpraktijk zijn uitgevoerd.

Meer informatie

Meer informatie over berekening van cijfers voor aandoeningen is op aanvraag beschikbaar.