

Nederlands Huisartsen Instituut
Postbus 2570 - 3500 GN Utrecht
Mariahoek 4 - tel. (030) 31 99 46

**CONTINUE MORBIDITEITS
REGISTRATIE PEILSTATIONS
JAARVERSLAG 1973**

INHOUD	Pagina
Voorwoord	5
Inleiding	7
Spreading der peilstationarissen over Nederland	8
De praktijkpopulaties	10
Te melden ziektebeelden en andere informatie	10
- De weekstaat	11
- De melding van individuele ziektegevallen	12
Verwerking der gegevens op de weekstaat	12
Enige resultaten met betrekking tot de weekrapportage over 1973	14
- Influenza (-achtig ziektebeeld)	15
- Leeftijds- en geslachtsverdeling	16
- Onderzoek naar de etiologie van het influenza-achtig ziektebeeld	16
- Tranquillizers voorgeschreven	17
- Leeftijds- en geslachtsverdeling	18
- Adviezen geboorteregeling (primaire consulten)	19
- Voor de eerste maal ovulatiemiddel voorgeschreven	19
- Leeftijdsverdeling	20
- Overige primaire adviezen inzake geboorteregeling	20
- Leeftijds- en geslachtsverdeling	21
- Morning-after-pill voorgeschreven	22
- leeftijdsverdeling	23
- Verzoek om abortus	24
- Leeftijdsverdeling	24
- Abortus provocatus (lege artis en niet lege artis)	25
- Leeftijdsverdeling	26
- Abortus provocatus versus verzoek om abortus	27
- Sterilisatie van de man	28
- Leeftijdsverdeling	29
- Consult druggebruik	29
- Leeftijds- en geslachtsverdeling	31

- (Vermoeden op) kindermishandeling	31
Extrapolatie van enkele gevonden frequenties op de Nederlandse bevolking	34
Algemene opmerkingen	36
Bijlagen 1 - 2	38-41
Tabellen 1a - 5	42-59
Figuren 1 - 16	60-76

VOORWOORD

Namens de Programmacommissie van het project Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations, bied ik U het 4e jaarverslag aan.

Het geeft informatie over een aantal morbiditeits- en behandelgegevens in de huisartspraktijk, o.a. abortus, sterilisatie en anti-conceptie.

Vrijwel alle huisartsen die sinds 1970 meewerken aan dit project verleenden wederom hun medewerking.

Daar het voor het volksgezondheidsbeleid van groot belang moet worden geacht dat beschikt kan worden over betrouwbare morbiditeitsgegevens hopen wij dat dit in opzet tijdelijke project ook in de toekomst gecontinueerd zal kunnen worden.

C.P. Bruins, arts

Voorzitter Programmacommissie

CONTINUE MORBIDITEITS REGISTRATIE PEILSTATIONS

Jaarverslag 1973

INLEIDING:

Het vierde jaar van het peilstationproject is zonder noemenswaardige problemen verlopen.

Met betrekking tot de opzet en werkwijze der peilstations mag naar het jaarverslag 1970 worden verwezen.

De programmacommissie¹⁾ vergaderde zesmaal.

Dr J.A.Stoop werd door H.O.Sigling, arts, de financiële deskundige, de heer H.C.M.J.Damen door de heer A.Schaap opgevolgd.

Dr M.J.Hartgerink trad als lid van de programmacommissie op 1 juli 1973 af wegens zijn benoeming tot Directeur van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde te Leiden. Hij werd bereid gevonden als adviseur van de programmacommissie zijn medewerking aan het project te blijven verlenen.

- 1) Programmacommissie : C.P.Bruins, arts (voorzitter)^{a)}
W.M.J.van Duyne, arts^{b)}
H.O.Sigling, arts^{c)} (Dr A.P.Oliemans, plaats-
vervangend lid^{c)})
- Coördinatoren : R.Drion, arts^{b)}
T.E.Halbertsma, arts^{c)}
- Financiële des-
kundigen : A.Schaap^{b)}
Mr.M.H.B.Thissen^{c)}
- Adviseurs : Prof.Dr J.C.van Es^{d)}
Dr M.J.Hartgerink^{f)}
- Projectleider : Dr H.Bijkerk^{e)}
- Wetenschappelijk
medewerker : Drs J.P.Dopheide, socioloog^{a)}

- a) *Nederlands Huisartsen Instituut*
- b) *Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne*
- c) *Stichting Nederlands Huisartsen Instituut*
- d) *Instituut voor Huisartsgeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht*
- e) *Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid*
- f) *Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde te Leiden*

Het éénjarig dienstverband van de heer J.P.Dopheide, wetenschappelijk medewerker aan het longitudinaal onderzoek werd met drie maanden verlengd. Op 1 november 1973 heeft hij zijn werkzaamheden voor het project afgesloten. Mej.M.de Jong werd als secretaresse op 1 mei 1973 door Mevr.G.A.M.Wolters-Wernert, Mej.T.van Geleuken, die voor halve dagen voor het project werkzaam was op 1 april 1973 door Mevr.A.C.A.M.van Welie-Verwey opgevolgd.

Het Praeventiefonds heeft sinds de aanvang van dit project de subsidiëring ten aanzien van de honorering van de deelnemende artsen voor haar rekening genomen. In het jaarverslag 1972 werd opgemerkt dat de programmacommissie ten aanzien van suggesties met betrekking tot de in de weekstaat op te nemen rubrieken nog hoofdzakelijk gevoed wordt door hen die nauw aan dit project verbonden zijn. Het is gebleken dat ook in 1973 geen commentaar en suggesties met betrekking tot dit project door buitenstaanders werden geleverd.

De Wereld Gezondheidsorganisatie blijft in dit project geïnteresseerd. Het ligt in de bedoeling dat Dr M.R.Radovanovic, regional officer for Communicable Diseases van het regionale bureau van de W.H.O. te Kopenhagen in mei 1974 Nederland zal bezoeken waarbij hij zich eveneens zal oriënteren over het peilstationproject.

Spreiding der peilstationartsen over Nederland (figuur 1)

Per 1 juli 1973 is een nieuw peilstation in Swifterband (Noord-

Oostpolder) erbij gekomen. In de overige peilstations hebben zich enkele kleine mutaties voltrokken (overname van de praktijk, vorming van groepspraktijk).

Het aantal deelnemende huisartsen - 56 - is vergeleken met 1972 (51 artsen) toegenomen. De reden hiervan ligt in de toeneming van het aantal groepspraktijken en het nieuwe peilstation in Swifterband. Bijlage 1 geeft een overzicht van de huisartsen die in 1973 aan het peilstationproject hebben deelgenomen.

Het volgende overzicht geeft een verdeling van het aantal peilstationartsen per provincie- en urbanisatiegroep in de jaren 1970 - 1973:

Provinciegroep	Aantal deelnemende artsen			
	1973	1972	1971	1970
A. Groningen, Friesland en Drenthe	8 ¹⁾	7 ²⁾	7 ²⁾	7 ²⁾
B. Overijssel, Gelderland en Zuidelijke IJsselmeerpolders	10 ²⁾	9 ²⁾	10 ²⁾	10 ²⁾
C. Utrecht, Noord- en Zuid-Holland	25 ⁴⁾	23 ²⁾	23 ²⁾	22
D. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg	13 ²⁾	12	13	14
Nederland	56	51	53	53

Urbanisatiegroep [*])	Aantal deelnemende artsen			
	1973	1972	1971	1970
1. Plattelandsgemeenten	12 ²⁾	11 ²⁾	12 ²⁾	10 ²⁾
2. Gemeenten met een stedelijk karakter tezamen met verstedelijkte plattelandsgemeenten	28 ⁵⁾	25 ³⁾	26 ³⁾	28 ²⁾
3. Gemeenten met 100 000 of meer inwoners	16 ²⁾	15	15	15
Nederland	56	51	53	53

^{*}) *Typologie van de Nederlandse gemeente naar urbanisatiegraad, 31 mei 1960 (Centraal Bureau voor de Statistiek)*

Waaronder:

- 1) 1 combinatiepraktijk met 3 artsen
- 2) 1 combinatiepraktijk met 2 artsen
- 3) 2 combinatiepraktijken met 2 artsen
- 4) 3 combinatiepraktijken met 2 artsen
- 5) 3 combinatiepraktijken met 2 artsen en 1 combinatiepraktijk met 3 artsen

De praktijkpopulaties

In 1973 werd opnieuw een integrale telling van de praktijkpopulaties van de peilstations verricht. In het algemeen blijkt het totaal der praktijkpopulaties in de onderscheiden provincie- en urbanisatiegroepen wat te zijn gegroeid. De praktijkpopulaties werden in leeftijdsgroepen gesplitst. De geboortecohort 1973 werd als 0-jarigen, de geboortecohort 1972 als 1-jarigen, enz., beschouwd. Daar de praktijk telling in het tweede en derde kwartaal 1973 heeft plaatsgevonden werden niet alle in 1973 geboren kinderen geteld. Hierdoor blijkt het aantal 0-jarigen veel te klein te zijn (25 - 50% van de werkelijke populatie van zuigelingen). Bij vorige tellingen werd de populatie welke geboren is in het tellingsjaar niet opgenomen in het totale bestand; zij die geboren waren in het jaar daarvoor werden dan als 0-jarigen beschouwd. Op grond van het bovenstaande is besloten de groep der 0-jarigen bij de bespreking der resultaten buiten beschouwing te laten.

Het verdient niettemin aanbeveling om de praktijkpopulaties elke 2 - 3 jaar opnieuw te tellen, aangezien bij een langer interval tussen de tellingen de verschuivingen in de populaties te grote verschillen zal kunnen geven tussen de "werkelijke" en berekende frequenties.

Te melden ziektebeelden en andere informatie

De weekstaat (bijlage 2)

De vragen op de weekstaat voor 1973 werden door de programmacommissie als volgt vastgesteld:

1. Nieuwe gevallen van influenza(-achtig ziektebeeld)¹⁾
2. Tranquillizers voorgeschreven
3. Advies geboorteregeling (uitsluitend primair consult)
4. Sterilisatie van de man (uitsluitend de verrichting)
5. Morning-after-pill voorgeschreven
6. Verzoek om abortus
7. Abortus provocatus (lege artis c.q. (vermoeden op) niet lege artis)
8. Consult druggebruik
9. (Vermoeden op) kindermishandeling

In de weekstaat voor 1973 werd ruimte opengelaten met het doel eventuele nieuwe rubrieken in de loop van 1973 in de weekstaat op te kunnen nemen. Hiervan werd echter geen gebruik gemaakt. De mogelijkheid om door middel van de peilstations gedurende een beperkte periode bijvoorbeeld een inzicht te krijgen van de prevalentie van bepaalde aandoeningen dan wel bij sommige ziektebeelden een onderzoek te verrichten naar de etiologie (bijv. de etiologie van acute diarreeën) is in dit project zeker mogelijk.

Evenals in de vorige jaren wordt in principe uitgegaan van een "week"-rapportage gedurende de periode van maandag tot en met vrijdag. De uitzonderingen hierop zijn: sterilisatie bij de man verricht, de melding van de "morning-after-pill" voorgeschreven, verzoek om abortus, abortus provocatus, zelfmoordpoging, consulten ter zake druggebruik en kindermishandeling, waarbij ook over zaterdag en zondag wordt gerapporteerd.

¹⁾ *Zie voor de criteria ten aanzien van de diagnose influenza-achtig ziektebeeld voetnoot op blz. 14 van het jaarverslag 1970*

De melding van individuele ziektegevallen

Met ingang van 1 januari 1974 is de melding van patiënten met een hartinfarct, een acute cerebrovasculaire aandoening of een epileptiformbeeld gestaakt. In totaal werden 981 patiënten met angineuze klachten, 822 nieuwe patiënten met een hartinfarct, 289 nieuwe patiënten met een acute cerebrovasculaire aandoening en 363 oude en nieuwe patiënten met een epileptiform beeld gemeld.

Het ligt in de bedoeling dat de follow-up periode van deze patiënten maximaal twee jaren zal zijn. Pas na deze periode zal een definitieve verwerking van de gegevens kunnen plaatsvinden.

Met betrekking tot de rubriek angineuze klachten is deze 2-jaars periode reeds verstreken (15 september 1973). De heer J.P.Dopheide, die als wetenschappelijk medewerker voor dit longitudinaal onderzoek werd aangetrokken, heeft de gegevens inzake angineuze klachten voor een belangrijk deel reeds verwerkt en voor automatische verwerking geschikt gemaakt. De definitieve resultaten kunnen in de loop van 1974 tegemoet worden gezien.

Verwerking der gegevens op de weekstaat

Dit verslag bevat de resultaten van de weekstaat over 1973. De gegevens werden verwerkt door de stafafdeling Epidemiologie en Informatica van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

Er worden als routine drie tabellen geproduceerd:

1. Het aantal patiënten per geslacht naar leeftijdsgroep
2. Het aantal patiënten per geslacht naar provinciegroep
3. Het aantal patiënten per geslacht naar urbanisatiegroep

De tabellen 1, 2 en 3 worden per kwartaal ten behoeve van de rapportage uitgedraaid. Tabel 1 wordt bovendien ook nog per peilstation ten gerieve van de deelnemende artsen geproduceerd.

De tabellen 1, 2 en 3 worden ten behoeve van de surveillance, vooral met betrekking tot het influenza-achtig ziektebeeld, ook per week

geproduceerd. Met uitzondering van de per peilstation verstrekte informatie, zijn de gegevens per 10 000 van de praktijkpopulatie uitgedrukt (frequentie). De frequenties zijn op hele getallen afgerond. Bij een frequentie onder de 0.5 per 10 000 inwoners is deze afgerond tot "0". Indien geen enkel geval werd gerapporteerd is dit aangegeven met "-". In principe meldt een peilstation over 5 dagen per week. In de praktijk blijkt echter dat in sommige weken over minder dagen wordt gerapporteerd of helemaal niet (ziekte, vakantie etc.). De gegevens van de artsen die 0, 1 of 2 dagen van de week hebben gerapporteerd worden niet verwerkt, terwijl de betrokken populaties van deze praktijken voor de berekening van de frequenties niet worden meegeteld.

De gegevens van de praktijken waar over 3, 4 of 5 dagen is gerapporteerd worden echter wel verwerkt, waarbij de aantallen welke betrekking hebben op influenza (-achtige ziektebeelden), tranquillizers voorgeschreven en adviezen geboorteregeling, worden gecorrigeerd met een correctiefactor van respectievelijk 1.67, 1.25 of 1, zodat een theoretische volledige "week" rapportage wordt bereikt. De gegevens betreffende de overige rubrieken blijven ongecorrigeerd. De kwartaalstaten worden opgebouwd uit de (gecorrigeerde) weekcijfers, waarbij de frequenties worden berekend op de gemiddeld in het kwartaal aanwezige populatie.

ENIGE RESULTATEN MET BETREKKING TOT DE WEEKRAPPORTAGE OVER 1973¹⁾

In het kader van dit jaarverslag werd niet beoogd een volledige analyse van het materiaal te geven.

De volgende kwartaaltabellen zijn hierbij ingesloten:

Tabellen 1a, 1b, 1c en 1d: het aantal patiënten per 10 000 van de leeftijdsgroep²⁾.

Tabellen 2a, 2b, 2c en 2d: het aantal patiënten per 10 000 van de provinciegroep.

Tabellen 3a, 3b, 3c en 3d: het aantal patiënten per 10 000 van de urbanisatiegroep.

Bij de bespreking der tabellen worden de volgende afkortingen of codes gebruikt:

- Influenza voor influenza (-achtig ziektebeeld)
- A voor provinciegroep Groningen, Friesland en Drenthe (noordelijke provincies)
- B voor provinciegroep Overijssel, Gelderland en Zuidelijke IJsselmeerpolders (oostelijke provincies)
- C voor provinciegroep Utrecht, Noord- en Zuid-Holland (westelijke en centrale provincies)
- D voor provinciegroep Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (zuidelijke provincies)
- 1 voor de urbanisatiegroep A₁ - A₄ (plattelandsgemeenten)
- 2 voor de urbanisatiegroep B₁ - B₃, C₁ - C₄ (gemeenten met stedelijk karakter tezamen met verstedelijkte plattelandsgemeenten)
- 3 voor de urbanisatiegroep C₅ (gemeenten met 100 000 of meer inwoners)

1) De tabellen met letters aangegeven zijn teksttabellen. De met Arabische cijfers aangeduide tabellen zijn met de bijlagen en de figuren achter de tekst opgenomen

2) In deze tabellen en daarvan afgeleide teksttabellen is altijd sprake van leeftijds specifieke frequenties

Influenza (-achtig ziektebeeld)

Tabel 4 en figuur 2 geven het aantal nieuwe gevallen van influenza per 10 000 inwoners per week, per provincie- en per urbanisatiegroep¹⁾.

De influenza-epidemie 1972/1973 werd reeds in het jaarverslag 1972 beschreven. In de 52e week van 1973 werd het duidelijk dat de incidentie van influenza begon toe te nemen (27 patiënten per 10 000 inwoners). In de twee voorgaande maanden bewoog de incidentie zich om een gemiddelde van 12 patiënten per 10 000 inwoners. De toeneming is voor het eerst opvallend in het oosten, midden en het westen van het land (provinciegroepen B en C). Een week later - de eerste week van 1974 - volgen ook de provinciegroepen A en D.

De top van de epidemie valt vrijwel overal in de 5e week van 1974 (78 patiënten per 10 000). De incidentie neemt daarna snel af en bereikt in de 12e weer dezelfde hoogte als die in de weken vlak voor het begin van de epidemie.

De hoogste incidenties worden waargenomen in de oostelijke provincies, waar de top in de 4e week valt (103 patiënten per 10 000) en in het zuiden van het land (132 patiënten per 10 000 in de 5e week). In de plattelandsgemeenten blijken de wekelijkse incidenties gedurende de epidemie duidelijk hoger te liggen dan in de overige gemeenten.

Op grond van de resultaten van het onderzoek bij patiënten met influenza door de mobiele unit van het Nationale Influenza Centrum kan worden vastgesteld dat de epidemie werd veroorzaakt door een influenza B-virus. Alle getypeerde B-stammen werden als B "intermediair" gedefinieerd.

1) Onder incidentie c.q. frequentie wordt hier en elders in de tekst verstaan de frequentie per 10 000 inwoners (c.q. mannen of vrouwen)

Leeftijds- en geslachtsverdeling

De leeftijds- en geslachtsverdeling geven tabel 5 en figuur 3. Hierbij is uitgegaan van de periode waarin de wekelijkse incidenties duidelijk verhoogd zijn: 52e week 1973 tot en met de 11e week 1974.

Van een significant geslachtsverschil is geen sprake.

De hoogste totaalfrequenties (52e week 1973 tot en met 11e week 1974) worden in de leeftijdsgroep 5 - 9 jaar waargenomen: bij circa 9% van deze leeftijdsgroep werd door de arts influenza vastgesteld. De leeftijdsgroepen 10 - 14, 1 - 4 en 15 - 19 volgen daarop met totaalfrequenties van respectievelijk 694, 599 en 584 per 10 000 inwoners.

De laagste frequenties worden gevonden in de leeftijdsgroepen 25 - 34 en ≥ 65 jaar: respectievelijk 311 en 295 per 10 000 inwoners.

Onderzoek naar de etiologie van het influenza-achtig ziektebeeld

Gedurende het influenzaseizoen 1973/1974 werd evenals in 1971/1972 en 1972/1973 door de mobiele unit van het Nationale Influenza Centrum te Rotterdam een onderzoek ingesteld naar de etiologie van door peilstationarissen gerapporteerde influenza-achtige ziektebeelden.

Hieraan werd door peilstationarissen in Groningen, Nijmegen, Eindhoven, Utrecht, Assen, Zelhem, Oirschot en Linschoten deelgenomen. Het onderzoek vond plaats van 4 december 1973 tot 10 maart 1974.

De resultaten van dit onderzoek zullen door het Nationale Influenza Centrum in een afzonderlijk artikel worden neergelegd.

Tranquillizers voorgeschreven

De kwartaalcijfers met betrekking tot het voorschrijven van tranquillizers uit de tabellen 1a t/m 3d zijn in figuur 4 schematisch weergegeven.

Tabel a geeft de totaal frequenties voor 1973

Tabel a.

Aantal patiënten aan wie tranquillizer werd voorgeschreven per provincie- en urbanisatiegroep, per 10 000, 1973

	<i>Provinciegroep</i>				<i>Urbanisatiegroep</i>			<i>Nederland</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
<i>1973</i>	<i>474</i>	<i>551</i>	<i>573</i>	<i>621</i>	<i>563</i>	<i>532</i>	<i>641</i>	<i>572</i>

Evenals in 1972 werd volstaan met een éénmalige rapportering in 1973 van patiënten aan wie tranquillizers werden voorgeschreven. De melding betrof uitsluitend patiënten aan wie librium, meprobamaat, nobrium, seresta of valium werd voorgeschreven. De indicatie waarop een tranquillizer werd voorgeschreven is hierbij niet van belang.

De totaal frequentie (572 per 10 000 is gelijk aan die in 1972:579 per 10 000).

Daar de totaal frequentie over 1972 betrekking heeft op slechts drie kwartalen (2e - 4e kwartaal) lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat in 1973 minder vaak één van de voornoemde tranquillizers werden voorgeschreven. Op de bijeenkomst van de peilstationartsen op 26 januari 1974 werd door verschillende peilstationartsen opgemerkt dat zij als gevolg van de hoge frequenties met betrekking tot het

voorschrijven van tranquillizers in 1972 zich kritischer hebben opgesteld en minder vaak tranquillizers hebben voorgeschreven. Een ander aspect waarop tijdens deze bijeenkomst de aandacht werd gevestigd is de invloed van het registreren op het voorschrijven van tranquillizers. Het registreren zou een meer kritische instelling van de arts ten aanzien van het voorschrijven van deze medicamenten ten gevolge hebben.

Leeftijds- en geslachtsverdeling

De leeftijds- en geslachtsverdeling geven tabel b en figuur 5.

Tabel b.

Aantal patiënten aan wie tranquillizer werd voorgeschreven naar leeftijdsgroep en geslacht, per 10 000, 1973

	<i>Leeftijdsgroep</i>										<i>Totaal</i>
	<i>1-4</i>	<i>5-9</i>	<i>10-14</i>	<i>15-19</i>	<i>20-24</i>	<i>25-34</i>	<i>35-44</i>	<i>45-54</i>	<i>55-64</i>	<i>≥65</i>	
<i>Mannen</i>	21	94	57	172	419	465	770	855	753	479	426
<i>Vrouwen</i>	50	36	71	369	655	830	1201	1285	1176	961	712
<i>Totaal</i>	34	65	63	269	545	650	986	1072	972	748	572

De leeftijds- en geslachtsverdeling verschillen vrijwel niet met die in 1972: een duidelijk overwegen van het aantal vrouwelijke patiënten in de leeftijdsgroepen boven 9 jaar, waarbij het opvalt dat de frequentie bij de vrouwen reeds vanaf de leeftijdsgroep 15 - 19 belangrijk hoger is.

De top wordt bij de mannen en de vrouwen in de leeftijdsgroep 45 - 54 jaar gevonden: respectievelijk 855 en 1285 patiënten per 10 000 mannen c.q. vrouwen.

Adviezen geboorteregeling (primaire consulten)

De rubriek "adviezen geboorteregeling" valt uiteen in twee onderdelen: "voor de eerste maal ovulatieremmer voorgeschreven" en "overige consulten".

Voor de eerste maal ovulatieremmer voorgeschreven

In tabel c zijn de totaal frequenties per 10 000 van alle vrouwen per provincie en urbanisatiegroep over 1970 tot en met 1973 samengevat (vergelijk figuur 6).

Tabel c.

Aantal primaire consulten inzake ovulatieremmer per provincie- en urbanisatiegroep, per 10 000 van alle vrouwen, 1970 - 1973

	<i>Provinciegroep</i>				<i>Urbanisatiegroep</i>			<i>Nederland</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
<i>1970</i>	<i>194</i>	<i>278</i>	<i>408</i>	<i>351</i>	<i>235</i>	<i>327</i>	<i>446</i>	<i>345</i>
<i>1971</i>	<i>186</i>	<i>294</i>	<i>417</i>	<i>443</i>	<i>246</i>	<i>396</i>	<i>418</i>	<i>374</i>
<i>1972</i>	<i>283</i>	<i>411</i>	<i>489</i>	<i>497</i>	<i>390</i>	<i>448</i>	<i>506</i>	<i>454</i>
<i>1973</i>	<i>342</i>	<i>407</i>	<i>487</i>	<i>481</i>	<i>393</i>	<i>470</i>	<i>479</i>	<i>457</i>

Tot en met 1972 blijkt de frequentie jaarlijks toe te nemen. Hieraan is in 1973 een einde gekomen. Dit geldt ook voor de meeste provincie- en urbanisatiegroepen. In de noordelijke provincies blijkt de frequentie echter nog steeds toe te nemen. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat er een zekere nivellering valt te constateren: de frequenties in de verschillende provincie- en urbanisatiegroepen naderen elkaar steeds meer. Zo blijken de frequenties in het midden en westen en in het zuiden van het land (groepen C en D) - respectievelijk 487 en 481 - en in de urbanisatiegroepen 2 en 3

- respectievelijk 470 en 479 - aan elkaar gelijk te zijn, en weinig af te wijken van het landelijk gemiddelde (457).

Leeftijdverdeling

In tabel d (vergelijk figuur 7) zijn de leeftijdsspecifieke frequenties met betrekking tot de primaire consulten ovulatieremmer per 10 000 vrouwen voor de jaren 1970 - 1973 gegeven.

Tabel d.

Aantal primaire consulten inzake ovulatieremmer naar leeftijdsgroep, per 10 000 vrouwen, 1970 - 1973

	<i>Leeftijdsgroep</i>					
	<i>10 - 14</i>	<i>15 - 19</i>	<i>20 - 24</i>	<i>25 - 34</i>	<i>35 - 44</i>	<i>45 - 54</i>
<i>1970</i>	<i>6</i>	<i>585</i>	<i>1248</i>	<i>815</i>	<i>311</i>	<i>93</i>
<i>1971</i>	<i>7</i>	<i>784</i>	<i>1402</i>	<i>794</i>	<i>328</i>	<i>71</i>
<i>1972</i>	<i>6</i>	<i>999</i>	<i>1534</i>	<i>1012</i>	<i>459</i>	<i>109</i>
<i>1973</i>	<i>19</i>	<i>1302</i>	<i>1500</i>	<i>892</i>	<i>427</i>	<i>119</i>

Er valt een duidelijke toeneming te constateren in de jongere leeftijdsgroepen, terwijl de frequentie in de leeftijdsgroep 25 - 34 is afgenomen. Sinds 1970 neemt de frequentie in de leeftijdsgroep 15 - 19 jaarlijks belangrijk toe. In 1973 is zij die in de leeftijdsgroep 20 - 24 reeds dicht genaderd: respectievelijk 1302 en 1500. De frequentie in de leeftijdsgroep 10 - 14, die in de jaren 1970 - 1972 om de 6 - 7 schommelde, blijkt eveneens in 1973 te zijn toegenomen (19).

Overige primaire adviezen inzake geboorteregeling

Tabel e geeft de totaal frequenties per 10 000 van alle mannen, c.q. vrouwen voor 1970 - 1973 met betrekking tot de overige primaire

consulten inzake geboorteregeling, per provincie- en urbanisatiegroep (vergelijk ook figuren 8 en 9).

Tabel e.

Aantal overige primaire consulten inzake geboorteregeling per provincie- en urbanisatiegroep, per 10 000 van alle mannen c.q. vrouwen, 1970 - 1973

	<i>Provinciegroep</i>								<i>Urbanisatiegroep</i>						<i>Nederland</i>	
	<i>A</i>		<i>B</i>		<i>C</i>		<i>D</i>		<i>1</i>		<i>2</i>		<i>3</i>		<i>M</i>	<i>V</i>
	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>		
1970	10	62	17	95	7	76	24	121	15	56	16	94	9	100	14	91
1971	12	44	16	129	29	99	68	193	23	103	43	125	24	123	34	120
1972	7	18	15	123	22	104	64	197	11	84	26	125	47	139	30	123
1973	24	102	36	145	22	87	50	161	38	108	25	123	41	113	33	117

Het aantal consulten per 10 000 van alle mannen c.q. vrouwen is in 1973 vrijwel gelijk aan die in 1972: respectievelijk 33 en 30 voor de mannen en respectievelijk 117 en 123 voor de vrouwen.

In de frequenties in de verschillende provincie- en urbanisatiegroepen zijn echter verschuivingen opgetreden. In de noordelijke en oostelijke provincies en de plattelands gemeenten zijn de frequenties duidelijk toegenomen. In de overige provincie- en urbanisatiegroepen blijken de frequenties gelijk te zijn gebleven of wat afgenomen te zijn.

Leeftijds- en geslachtsverdeling

In tabel f is een overzicht gegeven van de leeftijdsspecifieke frequenties, 1970 - 1973 (vergelijk figuur 10).

Tabel f.

Aantal overige consulten inzake geboorteregeling naar leeftijdsgroep per 10 000 mannen c.q. vrouwen, 1970 - 1973

Leeftijdsgroep	1970		1971		1972		1973	
	M	V	M	V	M	V	M	V
15 - 19	11	69	37	160	43	130	22	153
20 - 24	30	225	65	329	70	309	63	243
25 - 34	41	268	53	291	56	315	66	281
35 - 44	18	143	116	198	81	236	92	251
45 - 54	14	36	28	53	9	40	28	61

Belangrijke verschuivingen hebben zich met betrekking tot de leeftijds- en geslachtsverdeling in 1973 in vergelijking met 1972 niet voorgedaan.

De hoogste frequentie wordt voor de mannen in de leeftijdsgroep 35 - 44 (92) en voor de vrouwen in de leeftijdsgroep 25 - 34 (281) gevonden. De vrouwelijke patiënten zijn daarbij verre in de meerderheid.

Morning-after-pill voorgeschreven

Tabel g geeft de frequentie inzake het voorschrijven van demorning-after-pill in 1972 en 1973, per provincie- en urbanisatiegroep (vergelijk ook figuur 11).

Tabel g.

Aantal vrouwen aan wie de morning-after-pill werd voorgeschreven, per provincie- en urbanisatiegroep, per 10 000 van alle vrouwen, 1972 - 1973

	<i>Provinciegroep</i>				<i>Urbanisatiegroep</i>			<i>Nederland</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1972	34	42	55	68	45	41	81	53
1973	29	69	57	67	62	47	79	59

In 1973 werd aan nauwelijks meer vrouwen de morning-after-pill voorgeschreven dan in 1972: respectievelijk aan 59 en 53 vrouwen per 10 000 van alle vrouwen.

De frequentie is in de oostelijke provincies en in de plattelandsgemeenten duidelijk toegenomen; in de overige provinciegroepen blijkt zij gelijk of is zij slechts weinig toe- of afgenomen.

Leeftijdverdeling

Tabel h geeft de leeftijdsverdeling van de totaal frequenties inzake het voorschrijven van de morning-after-pill voor 1972 en 1973 (vergelijk figuur 11).

Tabel h.

Aantal vrouwen aan wie de morning-after-pill werd voorgeschreven naar leeftijdsgroep, per 10 000 vrouwen, 1972 - 1973

	<i>Leeftijdsgroep</i>					
	<i>10 - 14</i>	<i>15 - 19</i>	<i>20 - 24</i>	<i>25 - 34</i>	<i>35 - 44</i>	<i>45 - 54</i>
1972	2	148	150	117	67	7
1973	7	190	196	94	66	18

Vergeleken met 1972 zijn de frequenties in 1973 in de leeftijdsgroepen 10 - 24 en 45 - 54 duidelijk toegenomen. De hoogste frequenties worden gezien in de leeftijdsgroepen 15 - 19 en 20 - 24 jaar (respectievelijk 190 en 196).

Verzoek om abortus

Het aantal verzoeken om abortus per 10 000 van alle vrouwen, respectievelijk per provincie- en urbanisatiegroep, 1970 - 1973, is in tabel i samengevat (vergelijk figuur 12).

Tabel i.

Aantal verzoeken om abortus per provincie- en urbanisatiegroep, per 10 000 van alle vrouwen, 1970 - 1973

	<i>Provinciegroep</i>				<i>Urbanisatiegroep</i>			<i>Nederland</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
<i>1970</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>44</i>	<i>24</i>	<i>9</i>	<i>22</i>	<i>55</i>	<i>29</i>
<i>1971</i>	<i>31</i>	<i>35</i>	<i>45</i>	<i>53</i>	<i>24</i>	<i>40</i>	<i>62</i>	<i>43</i>
<i>1972</i>	<i>20</i>	<i>31</i>	<i>48</i>	<i>45</i>	<i>20</i>	<i>30</i>	<i>76</i>	<i>41</i>
<i>1973</i>	<i>18</i>	<i>38</i>	<i>41</i>	<i>30</i>	<i>26</i>	<i>28</i>	<i>55</i>	<i>36</i>

De in 1972 reeds gesignaleerde (lichte) daling heeft zich in 1973 voortgezet. Dit geldt met name voor de provincies in het midden, westen en zuiden van ons land en de urbanisatiegroep 3.

Leeftijdverdeling

De leeftijdsspecifieke frequenties per 10 000 vrouwen met betrekking tot het aantal verzoeken om abortus, 1970 - 1973, is in tabel j gegeven (vergelijk figuur 13).

Tabel j.

Aantal verzoeken om abortus naar leeftijdsgroep, per 10 000 vrouwen,
1970 - 1973

	<i>Leeftijdsgroep</i>					
	<i>10 - 14</i>	<i>15 - 19</i>	<i>20 - 24</i>	<i>25 - 34</i>	<i>35 - 44</i>	<i>45 - 54</i>
1970	2	80	68	66	46	4
1971	10	102	108	97	62	11
1972	2	122	84	87	72	10
1973	-	87	100	68	59	9

De leeftijdsgroep 20 - 24 jaar neemt in 1973 met een frequentie van 100 verzoeken om abortus per 10 000 vrouwen de eerste plaats in. De tweede en derde plaats worden door de leeftijdsgroepen 15 - 19 en 25 - 34 jaar ingenomen (respectievelijk 87 en 68).

Abortus provocatus (lege artis en niet lege artis)

Het aantal gevallen van niet lege artis opgewekte abortus is zeer klein. In 1973 werden per 10 000 van alle vrouwen geen of slechts 1 geval van abortus, per kwartaal, niet lege artis opgewekt, gerapporteerd.

Het aantal gevallen van abortus, lege artis opgewekt, per 10 000 van alle vrouwen en per provincie- en urbanisatiegroep, in de jaren 1971 tot en met 1973 is in tabel k gegeven (vergelijk figuur 14).

Tabel k.

Aantal gevallen van abortus provocatus, lege artis, per provincie- en urbanisatiegroep per 10 000 van alle vrouwen, 1971 - 1973

	<i>Provinciegroep</i>				<i>Urbanisatiegroep</i>			<i>Nederland</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1971	19	26	20	25	13	16	38	22
1972	21	21	37	28	16	20	57	30
1973	21	25	34	33	19	20	57	31

Het aantal vrouwen waarbij abortus lege artis werd opgewekt is vergeleken met 1972 vrijwel constant gebleven. Voor alle peilstations samen is de frequentie in 1972 en 1973 respectievelijk 30 en 31. In de frequenties in de provincie- en urbanisatiegroepen hebben zich eveneens geen grote veranderingen voltrokken.

Leeftijdverdeling

De leeftijdsspecifieke verdeling van het aantal gevallen van abortus provocatus (lege artis) per 10 000 vrouwen in de jaren 1971 - 1973 is in tabel l samengevat (vergelijk figuur 14).

Tabel l.

Aantal gevallen van abortus provocatus, lege artis, naar leeftijdsgroep, per 10 000 vrouwen, 1971 - 1973

	<i>Leeftijdsgroep</i>					
	<i>10 - 14</i>	<i>15 - 19</i>	<i>20 - 24</i>	<i>25 - 34</i>	<i>35 - 44</i>	<i>45 - 54</i>
1971	4	50	43	52	42	5
1972	2	69	68	70	49	11
1973	-	86	91	56	48	4

In 1971 en 1972 werden de hoogste frequenties in de leeftijdsgroepen 15 - 34 jaar gevonden. In 1973 is de frequentie in de leeftijdsgroep 25 - 34 teruggevallen tot op het niveau van 1971, terwijl de frequenties in de leeftijdsgroepen 15 - 19 en 20 - 24 opnieuw zijn toegenomen (respectievelijk 86 en 91).

Abortus provocatus versus verzoek om abortus, (figuur 15).

In het jaarverslag 1972 werd reeds opgemerkt dat het aantal verzoeken om abortus in 1972, vergeleken met 1971, vrijwel gelijk gebleven is terwijl het aantal gevallen van abortus provocatus is toegenomen. Dit leidde tot de veronderstelling dat in 1972 meer dan in 1971 honorering van de wens om geaborteerd te worden heeft plaatsgevonden.

De in 1972 geconstateerde ontwikkeling blijkt zich in 1973 te hebben voortgezet. Dit is vooral duidelijk indien de frequenties in de leeftijdsgroepen 15 - 44 in de jaren 1971 - 1973 met elkaar worden vergeleken (vergelijk tabel m en figuur 15).

Tabel m

Aantal verzoeken om abortus (A) en het aantal gevallen van abortus provocatus (B) naar leeftijdsgroep, per 10 000 vrouwen, 1971 - 1973*)

	<i>Leeftijdsgroep</i>											
	<i>15 - 19</i>			<i>20 - 24</i>			<i>25 - 34</i>			<i>35 - 44</i>		
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>%</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>%</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>%</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>%</i>
1971	102	50	49	108	43	40	97	52	54	62	42	68
1972	122	69	57	84	68	81	87	70	80	72	49	68
1973	87	86	99	100	91	91	68	56	82	59	48	81

*) De frequenties die betrekking hebben op het aantal gevallen van abortus provocatus zijn ook als percentages uitgedrukt van het aantal verzoeken om abortus.

In 1971 blijkt 40 - 68% van de verzoeken om abortus geresulteerd te hebben tot abortus provocatus. In 1973 zijn deze percentages aanzienlijk toegenomen: 81 - 99%!

De hoogste percentages (91 - 99%) worden in de leeftijdsgroepen 15 - 19 en 20 - 24 gezien. De mogelijkheid kan echter niet worden uitgesloten dat abortus provocatus ook buiten de huisarts om heeft plaatsgevonden. Dit zou betekenen dat vermoedelijk een onbekend aantal gevallen van abortus provocatus niet eerst als "verzoek om abortus" werd gerapporteerd.

Sterilisatie van de man

Het aantal bij de man verrichte sterilisaties per 10 000 van alle mannen per provincie- en urbanisatiegroep, in de jaren 1972 en 1973, is in tabel n gegeven (vergelijk figuur 16).

Tabel n.

Aantal verrichte sterilisaties bij de man, per provincie- en urbanisatiegroep per 10 000 van alle mannen, 1972 en 1973

	<i>Provinciegroep</i>				<i>Urbanisatiegroep</i>			<i>Nederland</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
<i>1972</i>	<i>15</i>	<i>19</i>	<i>22</i>	<i>33</i>	<i>9</i>	<i>25</i>	<i>30</i>	<i>24</i>
<i>1973</i>	<i>11</i>	<i>26</i>	<i>41</i>	<i>61</i>	<i>22</i>	<i>38</i>	<i>59</i>	<i>40</i>

Het aantal bij de man verrichte sterilisaties blijkt in 1973 belangrijk te zijn toegenomen. De landelijke frequentie is in 1972 en 1973 respectievelijk 24 en 40. Deze toeneming valt, met uitzondering van de noordelijke provincies in de overige provinciegroepen en in alle urbanisatiegroepen te constateren. De hoogste frequenties worden waargenomen in de zuidelijke provincies en in de gemeenten met 100 000 of meer inwoners: respectievelijk 61 en 59 per 10 000 mannen.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsspecifieke verdeling van het aantal verrichte sterilisaties per 10 000 mannen is in tabel o gegeven (vergelijk figuur 16).

Tabel o.

Aantal verrichte sterilisaties bij de man, naar leeftijdsgroep, per 10 000 mannen, 1972 - 1973

	<i>Leeftijdsgroep</i>					
	<i>15 - 19</i>	<i>20 - 24</i>	<i>25 - 34</i>	<i>35 - 44</i>	<i>45 - 54</i>	<i>55 - 64</i>
<i>1972</i>	-	3	42	105	35	-
<i>1973</i>	-	16	79	179	40	4

Evenals in 1972 wordt de hoogste frequentie in de leeftijdsgroep 35 - 44 jaar waargenomen: 179 verrichte sterilisaties per 10 000 mannen in 1973. Hierop volgen de leeftijdsgroepen 25 - 34 en 45 - 54 jaar met frequenties van respectievelijk 79 en 40.

Consult druggebruik

Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen primaire en herhalingsconsulten. Het aantal primaire en herhalingsconsulten inzake druggebruik per 10 000 van alle mannen c.q. vrouwen en per provincie- en urbanisatiegroep in 1972 en 1973 is in tabel p gegeven.

Tabel p.

Aantal primaire en herhalingsconsulten inzake druggebruik per 10 000 van alle mannen c.q. vrouwen en per provincie- en urbanisatiegroep, 1972 - 1973

	<i>Provinciegroep</i>								<i>Urbanisatiegroep</i>						<i>Nederland</i>	
	<i>A</i>		<i>B</i>		<i>C</i>		<i>D</i>		<i>1</i>		<i>2</i>		<i>3</i>		<i>M</i>	<i>V</i>
	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>		
<i>Primaire consulten</i>																
1972	5	-	1	-	6	4	1	2	2	-	1	1	8	5	3	2
1973	12	7	6	1	3	2	5	4	3	2	4	3	8	4	5	2
=====																
<i>Herhalingsconsulten</i>																
1972	7	1	-	-	15	9	1	6	-	-	0	3	25	16	8	6
1973	2	-	49	-	7	5	3	2	1	-	21	1	12	9	14	3

Het aantal primaire consulten door mannen is wat toegenomen, het aantal primaire consulten door vrouwen gelijk gebleven. Hieraan kan echter niet veel betekenis worden toegekend gezien de kleine frequenties waar het omgaat. De hoogste frequenties vallen, en dat geldt zowel voor de mannen als voor de vrouwen, in de noordelijke provincies en urbanisatiegroep 3.

De herhalingsconsulten zijn met betrekking tot de mannen eveneens toegenomen. De frequentie die betrekking heeft op de vrouwelijke patiënten is afgenomen.

De frequentie in de onderscheidene provincie- en urbanisatiegroepen lopen ver uiteen. Opvallend is de hoge frequentie van het aantal mannelijke patiënten in de oostelijke provincies (49).

In de weekstaat 1974 zal deze categorie van druggebruik niet meer worden opgenomen.

Leeftijds- en geslachtsverdeling

Volstaan wordt met de leeftijds- en geslachtsverdeling van de primaire consulten (tabel q).

Tabel q.

Aantal primaire consulten inzake druggebruik naar leeftijdsgroep en geslacht, per 10 000, 1972 - 1973

	<i>Leeftijdsgroep</i>											
	10 - 14		15 - 19		20 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54	
	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>
1972	2	2	24	19	14	4	2	2	-	-	-	-
1973	2	-	34	24	16	3	3	3	1	1	1	-

De hoogste frequenties worden evenals in 1972 in de leeftijdsgroep 15 - 19 waargenomen (respectievelijk 34 en 24 voor mannen en vrouwen). De leeftijdsgroepen 20 - 24 en 25 - 34 jaar volgen daarop met frequenties van respectievelijk 16 en 3 en respectievelijk 3 en 3.

De mannelijke patiënten overwegen in het algemeen duidelijk.

(Vermoeden op) kindermishandeling

Het aantal gerapporteerde gevallen van kindermishandeling is zeer klein. De leeftijdsspecifieke frequenties zijn echter misleidend doordat zij gebaseerd zijn op zeer kleine populaties.

Om die reden zal hier worden volstaan met het geven van absolute aantallen. Het volgende overzicht geeft het aantal gerapporteerde gevallen (vermoeden op) van kindermishandeling.

Aantal gevallen waarbij kindermishandeling werd vastgesteld of vermoed naar leeftijdsgroep, 1973 (absoluut)

	Leeftijdsgroep										
	< 1		1 - 4		5 - 9		10 - 14		Totaal		
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	Totaal
Aantal gevallen	1	1	2	2	2	2	1	3	6	8	14
waarvan ter kennis gebracht van vertrouwensarts	-	1	-	-	1	2	-	1	1	4	5

Aantal gevallen waarbij kindermishandeling werd vastgesteld of vermoed naar provincie- en urbanisatiegroep, 1973 (absoluut)

	Provinciegroep				Urbanisatiegroep			Nederland
	A	B	C	D	1	2	3	
	-	2 ¹⁾	10 ²⁾	2 ³⁾	3 ⁴⁾	2 ³⁾	9 ⁵⁾	14

Gemeld door:

1) 1 peilstation

2) 2 peilstations met elk 4 patiënten en 2 peilstations met elk 1 patiënt

3) 2 peilstations met elk 1 patiënt

4) 1 peilstation met 2 patiënten en 1 peilstation met 1 patiënt

5) 2 peilstations met elk 4 patiënten en 1 peilstation met 1 patiënt

Vertrouwensarts

Van de vijf patiënten zijn er drie (allen van dezelfde arts) door anderen dan de arts zelf, ter kennis gebracht van de vertrouwensarts. De overige twee patiënten zijn door de arts zelf ter kennis gebracht van de vertrouwensarts.

Voor de bevinding dat tien patiënten niet ter kennis gebracht zijn van de vertrouwensarts werden de volgende redenen opgegeven:

1. De gezinssituatie wordt door de arts zelf onder controle gehouden.
2. Het probleem werd in overleg met de maatschappelijk werkster opgelost.
3. De arts werkt in een home-team waarin onder andere een wijkverpleegster en een maatschappelijk werkster zitting hebben. Dit home-team wordt ingezet bij het ontrafelen van de vaak ingewikkelde gezinsstructuur en bij het vinden van een gunstige oplossing van het probleem. De vertrouwensarts werd niet ingeschakeld op grond van de overweging dat hij weinig meer kan bieden dan het home-team zelf.

EXTRAPOLATIE VAN ENKELE GEVONDEN FREQUENTIES OP DE NEDERLANDSE BEVOLKING

Het volgende overzicht geeft een globale indruk van het aantal patiënten, consulten e.d. in Nederland, indien wordt uitgegaan van de frequenties, berekend uit de resultaten van de continue morbiditeitsregistratie door peilstations, met betrekking tot tranquilizers, geboorteregeling, morning-after-pill, abortus provocatus en sterilisatie van de man.

Hierbij dient, evenals in het jaarverslag 1972 werd opgemerkt, niet uit het oog te worden verloren dat de peilstationartsen een select gekozen groep zijn. In hoeverre de uitkomsten van de werkelijke situatie afwijken is dan ook niet zondermeer vast te stellen. Het is echter interessant vast te stellen dat de schatting van 21 000 lege artis verrichte abortussen nagenoeg overeenkomt met het resultaat van een onderzoek dat in het kader van de Staatscommissie inzake het bevolkingsonderzoek is uitgevoerd door de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid en het Nederlands Instituut voor Sociaal-Sexuologisch onderzoek (NISSO).

Rubriek	Periode	Frequentie ¹⁾		Totaal	Nederland ²⁾		Totaal
		M	V		M	V	
<i>Tranquillizers voor eerste maal in die perio- de voorgeschre- ven</i>	<i>2e-4ekwart. '72</i>	421	734	579	279000	488000	768000
	1973	426	712	572	284000	478000	766000
<i>Primaire con- sulten inzake ovulatiereem- mer</i>	1970		345			225000	
	1971		374			246000	
	1972		454			302000	
	1973		457			307000	

(vervolg)

Rubriek	Periode	Frequentie ¹⁾		Totaal	Nederland ²⁾		Totaal
		M	V		M	V	
Overige con- sulten inzake geboorterege- ling	1970	14	91		9000	59000	
	1971	34	120		22000	79000	
	1972	30	123		20000	82000	
	1973	33	117		22000	79000	
Morning-after- pill voorge- schreven	1972		53			35000	
	1973		59			40000	
Aantal verzoek- ken om abor- tus	1970		29			19000	
	1971		43			28000	
	1972		41			27000	
	1973		36			24000	
Abortus, le- ge artis ver- richt	1971		22			14000	
	1972		30			20000	
	1973		31			21000	
Sterilisatie van de man verricht	1972	24			16000		
	1973	40			27000		

1) Aantal patiënten, consulten etc. per 10 000 mannen en/of vrouwen (gegevens peilstations)

2) Extrapolatie van de frequenties op de Nederlandse bevolking. Afgerond op duizendtallen

ALGEMENE OPMERKINGEN

1. De vragen op de weekstaat voor 1974 zijn door de programma-commissie als volgt samengesteld:
 - a. Nieuwe gevallen van influenza (-achtig ziektebeeld)
 - b. Tranquillizer voorgeschreven
 - c. Advies geboorteregeling (uitsluitend primaire consulten)
 - d. Consult inzake rookverslaving
 - e. Sterilisatie van de man verricht
 - f. Sterilisatie van de vrouw verricht
 - g. Morning-after-pill voorgeschreven
 - h. Verzoek om abortus
 - i. Abortus provocatus
 - j. (Vermoeden op) kindermishandeling

2. Suggesties die betrekking hebben op de vraagstelling van de weekstaten worden gaarne door de programmacommissie ontvangen en op hun waarde voorzover zij betrekking hebben op hun toepassing in dit project, beoordeeld.

Dr. H.Bijkerk (projectleider)

Bijlage 1

Continue Morbiditeits Registratie Peilstations
1973

Deelnemende artsen

Naam:	Plaats:	Provincie:
A.A.E.E. Brockmöller ^{†)}	't Zandt	Groningen
F.H. Mulder	Groningen	Groningen
Chr. Schotanus ^{†)}	Oostermeer	Friesland
J. Vennema	Franeke	Friesland
W.G. Bliëk (vanaf 1-1-'73) ^{†)}	Schoonoord	Drente
H.W. Reinking/F.M. van Soest/ R.F. Sparenburg (comb.praktijk)	Assen	Drente
Th. J. van Dam (vanaf 1-7-'73)	Swifterbant	Overijssel
Dr H. K. Muller	Kampen	Overijssel
H. Nap	Gramsbergen	Overijssel
R. C. Veldhuyzen van Zanten ^{†)}	Enter	Overijssel
J. E. Bekkering	Nijmegen	Gelderland
Th. M. G. van Berkestijn	Velp	Gelderland
J. H. de Boer/Dr J. van Noort (comb.praktijk) ^{†)}	Zelhem	Gelderland
J. P. van Dam	Nijmegen	Gelderland
Dr H. Mulder ^{†)}	Heerde	Gelderland
H. J. de Bruin	Utrecht	Utrecht
G. E. v. d. Burger ^{†)}	Linschoten	Utrecht
J. Hartog/F. K. A. Fokkema (comb.praktijk)	Amersfoort	Utrecht

Bijlage 1 (vervolg)

Deelnemende artsen

Naam:	Plaats:	Provincie:
J. Busquet	Alkmaar	Noord-Holland
C. den Hartoog ^{†)}	Broek in Waterland	Noord-Holland
A. A. M. E. Janssen	Heiloo	Noord-Holland
H. J. v. d. Leen	Hilversum	Noord-Holland
Dr P. A. Roorda	Haarlem	Noord-Holland
G. J. Schiethart	Amsterdam	Noord-Holland
H. O. Sigling/Mw. A. J. Arlouw (comb. praktijk)	Amstelveen	Noord-Holland
Mw. P. J. Visser	Amsterdam	Noord-Holland
H. L. van Amerongen/Mw. H. J. Haag (comb. praktijk)	Rotterdam	Zuid-Holland
Dr B. J. M. Aulbers	Delft	Zuid-Holland
J. Beunk	Maassluis	Zuid-Holland
Dr A. W. Bots ^{†)}	Voorhout	Zuid-Holland
G. Dorrenboom	Rotterdam	Zuid-Holland
G. van Gangelen	Sliedrecht	Zuid-Holland
J. B. Hugenholtz	Oegstgeest	Zuid-Holland
Dr A. P. Oliemans	Den Haag	Zuid-Holland
A. G. Stam	Dordrecht	Zuid-Holland
Th. J. van Stockum Jr.	Den Haag	Zuid-Holland
B. J. van Vianen	Den Haag	Zuid-Holland
R. J. P. Bauwens	Terneuzen	Zeeland
M. Reyerse	Middelburg	Zeeland
K. E. W. Ebeling-Koning	Eindhoven	Noord-Brabant
Dr H. A. M. Hoevenaars ^{†)}	Uden	Noord-Brabant

Bijlage 1 (vervolg)

Deelnemende artsen

Naam:	Plaats:	Provincie:
R.J.F.M.Leijgraaf/A.F.A.van de Reepe (comb.praktijk) ^{‡)}	Etten	Noord-Brabant
S.H.H.M.v.d.Meer ^{‡)}	Rosmalen	Noord-Brabant
Dr J.P.C.Moors ^{‡)}	Rosmalen	Noord-Brabant
J.W.G.A.van Rens ^{‡)}	Oirschot	Noord-Brabant
A.Sluyters	Ravenstein	Noord-Brabant
I.J.Velzeboer	Eindhoven	Noord-Brabant
N.G.M.Courtens	Maastricht	Limburg
J.M.M.Hermans	Weert	Limburg

^{‡)} Apotheek-houdend

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
1E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

LEEFTYDS GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD)			TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN			ADV.-GEB.-REG. OVUL REMM OVERIGE ADVIEZEN			1E MAAL		MOR- NING AFTER		VERZ TOT ABOR TUS		ABORT.-PROV LEGE NIET ARTIS L.-A.		
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	V	M	T	M	V	M	V	M	V	M	V
< 1 JR	1202	1116	2318	567	391	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4 JR	5972	5343	11315	501	524	512	3	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9 JR	7130	6775	13905	268	256	262	7	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14 JR	6435	6187	12622	246	236	241	17	20	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19 JR	5887	5820	11707	360	360	360	50	107	78	276	12	30	21	-	43	12	12	-	-	-
20 - 24 JR	6715	7604	14319	473	385	426	122	181	153	366	15	51	34	3	50	25	24	-	-	-
25 - 34 JR	11207	11359	22566	429	344	386	153	274	214	241	8	69	39	22	23	18	19	-	-	-
35 - 44 JR	8793	8821	17614	450	389	420	292	421	357	112	23	63	43	38	17	11	9	1	-	-
45 - 54 JR	7421	7621	15042	400	357	378	252	453	354	27	1	13	7	8	4	1	-	-	-	-
55 - 64 JR	5960	6429	12389	375	348	361	266	399	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=> 65 JR	6363	7982	14345	307	407	363	140	353	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	73086	75057	148143	388	360	374	136	238	188	111	6	27	17	9	14	8	7	0	-	-

tabel 1a(vervolg)

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
1E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

LEEFTYDS GROEP	CONSULT DOOR GEBRUIKER ZELF						DRUGGEBRUIK HERH. CONSULT						(VERMOEDEN OP) KINDERMISHANDELING TER KENNIS GEB. VAN VERTROUWENSARTS DOOR ANDEREN							
	1E CONSULT		2E CONSULT		3E CONSULT		M		V		T		M		V		T			
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	T	
< 1 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
5 - 9 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15 - 19 JR	7	-	4	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24 JR	3	1	2	14	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 34 JR	1	-	0	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 44 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 - 54 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - 64 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=> 65 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	1	0	1	2	0	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-

AANTAL WEEKSTATEN 637 WAARVAN GECORRIGEERD 145 MET 0248 RAPPORTERINGS-DAGEN.

tabel 2a

PROVINCIE GROEP		CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIENS														
		1E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000														
POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD)			TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN			ADV.GEB.-REG. 1E MAAL OVUL REMM OVERIGE ADVIEZEN			MOR- NING AFTER PILL		ABORT.PROV LEGE NIET ARTIS L.A.A.			
M	V	M	T	V	M	T	V	M	T	V	M	T	M	V	V	V
GR+FR+DR	7934	8187	16122	446	444	93	172	133	82	9	16	13	5	7	4	6
OV+6LD+ZYP	12962	13086	26049	387	331	359	117	154	116	2	32	17	3	15	8	7
UTR+NH+ZH	34899	36202	71101	249	244	246	141	273	208	116	5	19	12	9	13	8
ZLD+NB+LIM	17291	17581	34872	645	581	613	159	259	210	110	11	44	8	15	19	8
TOTAAL	73086	75057	148143	388	360	374	136	238	188	111	6	27	17	9	14	8

tabel 2a(vervolg)

PROVINCIE GROEP		CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIENS														
		1E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000														
CONSULT DOOR GEBRUIKER ZELF		DRUGGEBRUIK (VERMOEDEN OP) KINDERMISHANDELING - TER KENNIS GEB. VAN VERTROUWENSARTS DOOR ANDEREN			AANTAL PATIENTEN DOOR UZELF			AANTAL PATIENTEN DOOR ANDEREN			MOR- NING AFTER PILL		ABORT.PROV LEGE NIET ARTIS L.A.A.			
M	V	M	T	V	M	T	V	M	T	V	M	T	M	V	V	V
GR+FR+DK	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OV+6LD+ZYP	1	-	0	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTR+NH+ZH	1	0	1	3	1	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ZLD+NB+LIM	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	1	0	1	2	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

AANTAL WEEKSTATEN 637 MAARVAN GECORRIGEERD 145 MET 0248 RAPPORTERINGSDAGEN.

tabel 3a

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
1E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIE GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD)		TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN		ADV.-GEB.-REG. 1E MAAL OVUL REMH OVERIGE ADVIEZEN		MOR- NING AFTER PIL		ABORT-PROV TOT ABOR LEGE NIET ARTIS L.A.							
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	V	V					
A1-A4	14998	14526	29524	451	409	430	123	182	152	97	5	18	11	3	11	5	2	-
B1-B3+C1-C4	36608	37523	74131	319	302	311	124	233	179	109	7	32	20	8	15	6	4	0
C5	21480	23009	44489	463	422	442	164	281	225	124	8	23	16	14	16	12	17	-
TOTAAL	73086	75057	148143	388	360	374	136	238	188	111	6	27	17	9	14	8	7	0

tabel 3a(vervolg)

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
1E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIE GROEP	CONSULT DOOR DRUGGEBRUIK DOOR GEBRUIKER ZELF			CONSULT DOOR HERH. CONSULT			AANTAL PATIENTEN (VERMOEDEN OP) KINDERMISHANDELING TER KENNIS GEB. VAN VERKROUWENSARTS DOOR ANDEREN			AANTAL PATIENTEN DOOR UZELF			AANTAL PATIENTEN DOOR ANDEREN		
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T
A1-A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1-B3+C1-C4	1	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	2	0	1	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

tabel 1b

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
2E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

LEEFTYDS GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD)			TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN			ADV.-GEB.-REG. 1E MAAL			STER MAN AFTER VERR	MOR- NING AFTER PIL	VERZ TOT ABOR TUS	ABORT.-PROV. LEGE NIET ARTIS L.A.	
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V					T
< 1 JK	1188	1105	2293	252	127	192	-	9	4	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4 JK	5826	5230	11056	183	194	188	3	8	5	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9 JK	6941	6600	13541	77	94	85	15	-	8	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14 JK	6216	5948	12164	66	56	61	20	24	22	-	-	2	1	-	5	-
15 - 19 JK	5659	5604	11263	85	74	80	47	98	72	437	5	53	29	-	48	34
20 - 24 JK	6499	7429	13928	113	84	97	112	175	146	395	27	62	46	3	48	32
25 - 34 JK	11050	11218	22268	74	75	75	142	233	188	272	14	85	50	17	29	18
35 - 44 JK	8530	8498	17028	98	74	86	174	321	247	140	28	67	47	49	18	25
45 - 54 JK	7033	7230	14263	66	89	78	264	350	308	45	12	18	15	10	7	4
55 - 64 JK	5636	6095	11732	67	46	56	199	367	286	-	-	-	-	-	-	-
=> 65 JK	6036	7559	13594	48	68	59	131	248	196	1	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	70614	72516	143130	89	84	87	114	193	154	137	10	33	22	10	16	12

tabel 1b(ervolg)

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
2E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

LEEFTIJS GROEP	CONSULT DOOR GERRUIKER ZELF				DRUGGERUIK HERH. CONSULT				(VERHOEDEN OP) KINDERMISHANDELING . TER KENNIS GEB. VAN VERTROUWENSARTS DOOR UZELF				AANTAL PATIENTEN DOOR ANDEREN			
	IE CONSULT		HERH. CONSULT		AANTAL PATIENTEN		DOOR UZELF		DOOR ANDEREN		DOOR UZELF		DOOR ANDEREN			
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	
< 1 JR	-	-	-	-	-	-	-	9	4	-	-	-	-	-	-	
1 - 4 JR	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
5 - 9 JK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 - 14 JK	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
15 - 19 JR	6	12	9	24	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 - 24 JR	5	-	2	19	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 - 34 JR	-	2	1	9	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35 - 44 JR	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 - 54 JR	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55 - 64 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
=> 65 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAAL	1	1	1	5	1	3	-	0	0	-	-	-	-	-	-	

AANTAL WEEKSTATEN 637 WAARVAN GECORRIGEERD 240 MET 0557 RAPPORTERINGS-DAGEN.

tabel 2b

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
2E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

PROVINCIE GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD)			TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN			ADV.GEB.-REG. 1E MAAL OVUL RENN OVERIGE ADVIEZEN			STER MAN AFTER VERR		MOR- NING AFTER PIL		VERZ TOT ABOR TUS		ABORT-PROV LEGE NIET ARTIS L.A.	
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	M	V	M	V	
GR+FR+DR	6756	6892	13648	75	44	59	83	133	108	119	10	37	23	4	9	4	6	1	
OV+GLD+ZYP	12456	12568	25024	76	69	73	127	161	144	103	8	38	23	5	17	11	6	-	
UTR+NH+ZH	33548	34934	68482	58	49	53	113	205	160	145	7	20	14	9	17	17	8	0	
ZLD+NR+LIM	17855	18121	35976	164	175	170	120	216	168	154	15	56	35	17	19	6	9	-	
TOTAAL	70614	72516	143130	89	84	87	114	193	154	137	10	33	22	10	16	12	8	0	

tabel 2b(vervolg)

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
2E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

PROVINCIE GROEP	CONSULT DOOR 1E CONSULT			DRUGGERUIK GERRUJKER ZELF HERH. CONSULT			AANTAL PATIENTEN (VERMOEDEN OP) KINDERISHANDELING TER KENNIS GEB. VAN VERTROUWENSARTS DOOR ANDEREN		
	M	V	T	M	V	T	M	V	T
GR+FR+DR	3	4	4	-	-	-	-	-	-
OV+GLD+ZYP	1	-	0	19	-	9	-	-	-
UTR+NH+ZH	1	1	1	4	1	2	1	0	-
ZLD+NR+LIM	1	1	1	-	1	1	-	-	-
TOTAAL	1	1	1	5	1	3	0	0	-

AANTAL WEEKSTATEN 637 MAARVAN GECORRIGEERD 240 MET 0557 RAPPORTERINGS-DAGEN.

tabel 3b

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
2E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIE GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD)		TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN		ADV.GEB.-REG. 1E MAAL		STER- MAN AFTER PIIL		MOR- NING AFTER PIIL		VERZ TOT ABOR TUS		ABORT.PROV LEGE NIET ARTIS L.A.			
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	
A1-A4	15057	14590	29648	116	119	118	109	173	141	112	9	30	19	5	18	7	5	1
B1-B3+C1-C4	34481	35321	69802	56	52	54	106	184	146	144	8	38	23	10	13	8	5	-
C5	21076	22604	43680	125	111	118	130	222	177	144	12	29	21	12	20	21	14	-
TOTAAL	70614	72516	143130	89	84	87	114	193	154	137	10	33	22	10	16	12	8	0

tabel 3b(vervolg)

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
2E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIE GROEP	CONSULT DOOR 1E CONSULT		DRUGGEBRUIK DOOR GEBRUIKER ZELF		AANTAL PATIENTEN		(VERHOEDEN OP) KINDERMISHANDELING TER KENNIS GEB. VAN VERTROUWENSARTS DOOR UZELF		DOOR ANDEREN			
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T
A1-A4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1-B3+C1-C4	1	1	1	7	-	4	-	-	-	-	-	-
C5	1	2	2	5	3	4	-	1	1	-	-	-
TOTAAL	1	1	1	5	1	3	-	0	0	-	-	-

AANTAL WEEKSTATEN 637 WAARVAN GECORRIGEERD 240 MET 0557 RAPPORTERINGSDAGEN.

tabel 1c(vervolg)

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
3E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

LEEFTYDS GROEP	CONSULT DOOR GEBRUIKER ZELF				DRUGGEBRUIK HERH. CONSULT				CONSULT DOOR ANDEREN				(VERMOEDEN OP) KINDERMISHANDELING . TER KENNIS GEB. VAN VERTROUWENSARTS DOOR ANDEREN			
	H	V	T	M	H	V	T	M	H	V	T	M	H	V	T	M
< 1 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	17	-	-	-	-	-
1 - 4 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	3	1	-	-
5 - 9 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
10 - 14 JR	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19 JR	13	4	6	27	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24 JR	5	2	3	23	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 34 JR	1	-	0	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 44 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 - 54 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - 64 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=> 65 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	2	0	1	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AANTAL WEEKSTATEN 636 WAARVAN GECORRIGEERD 230 MET 0157 RAPPORTERINGS-DAGEN.

tabel 2c

PROVINCIE GROEP		CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS 3E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000										MOR- NING TOT ABOR TUS		ABORT.PROV LEGE NIET ARTIS L.A.			
		POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD)		TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN		ADV.GEB.REG. 1E MAAL OVUL REMH OVERIGE ADVIEZEN		STER MAN AFTER VERR		VERZ TOT ABOR TUS		ABORT.PROV LEGE NIET ARTIS L.A.			
M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	
GR+FR+DR	5517	5556	11073	36	27	32	80	195	138	85	4	20	12	2	4	2	2
OV+GLD+ZYP	12430	12613	25043	106	81	93	133	144	139	105	17	38	28	6	17	7	5
UTR+NH+ZH	27463	29260	56723	51	48	50	85	134	110	126	5	24	15	10	14	9	11
ZLD+NB+LIM	13707	14287	27994	113	112	113	86	151	119	124	10	26	18	15	13	9	12
TOTAAL	59117	61716	120833	76	68	72	95	146	121	117	9	27	18	9	14	8	9

tabel 2c(ervolg)

PROVINCIE GROEP		CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS 3E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000										MOR- NING TOT ABOR TUS		ABORT.PROV LEGE NIET ARTIS L.A.			
		CONSULT DOOR GEBRUIKER ZELF 1E CONSULT		DRUGGEBRUIK (VERMOEDEN OP) KINDERHISHANDELING. TER KENNIS.GEB. VAN VERTROUWENSARTS DOOR ANDEREN		AANTAL PATIENTEN DOOR UZELF		ADV.GEB.REG. 1E MAAL OVUL REMH OVERIGE ADVIEZEN		STER MAN AFTER VERR		VERZ TOT ABOR TUS		ABORT.PROV LEGE NIET ARTIS L.A.			
M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	
GR+FR+DR	4	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OV+GLD+ZYP	2	1	1	14	-	7	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
UTR+NH+ZH	1	0	1	0	2	1	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
ZLD+NB+LIM	2	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	2	0	1	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AANTAL WEEKSTATEN 636 WAARVAN GECORRIGEERD 230 MET 0157 RAPPORTERINGS-DAGEN.

tabel 3c

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
3E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIE GROEP	POPULATIE			INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD)			TRANQUILLIZER VOORSCHEVEN			ADV.-GEB.-REG. 1E MAAL OVUL REMM OVERIGE ADVIEZEN			STER MAN AFTER VERR			MOR- NING AFTER PIL			VERZ TOT ABOR TUS			ABORT.-PROV LEGE NIET ARTIS L.A.		
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T
A1-A4	13756	13553	27308	93	97	95	135	167	151	109	15	23	19	5	14	9	7	1						
B1-B3+C1-C4	29369	30759	60128	60	45	52	78	126	103	118	5	27	16	10	11	7	7	-						
C5	15992	17404	33396	91	86	88	91	164	129	120	10	30	20	13	18	10	15	1						
TOTAAL	59117	61716	120833	76	68	72	95	146	121	117	9	27	16	9	14	8	9	1						

tabel 3c(vervolg)

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
3E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIE GROEP	CONSULT DOOR DRUGGEBRUIK (VERMOEDEN OP) KINDERMISHANDELING .			CONSULT DOOR GEBRUIKER ZELF			CONSULT AANTAL PATIENTEN			TER KENNIS GEB. VAN VERTROUWENSARTS DOOR ANDEREN		
	1E CONSULT			HERH. CONSULT			AANTAL PATIENTEN			DOOR UZELF		
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T
A1-A4	1	1	-	-	-	1	-	0	-	-	-	-
B1-B3+C1-C4	1	1	8	1	4	-	-	0	0	-	-	-
C5	4	-	2	1	2	1	1	1	-	-	-	-
TOTAAL	2	0	1	4	1	3	0	0	0	0	0	-

AANTAL WEEKSTATEN 636 WAARVAN GECORRIGEERD 230 MET 0157 RAPPORTERINGS-DAGEN.

tabel 1d(vervolg)

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS

4E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

LEEFTYDS GROEP	CONSULT DOOR GEBRUIKER ZELF		DRUGSBEGRUIK HERH. CONSULT		AANTAL PATIENTEN		(VERMOEDEN OP) KINDERMISHANDELING - TER KENNIS GEB. VAN VERTROUWENSARTS		DOOR UZELF		DOOR ANDEREN		
	M	V	M	V	M	V	T	M	V	T	M	V	T
< 1 JK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4 JK	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
5 - 9 JK	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	2	2
10 - 14 JK	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1
15 - 19 JK	8	8	18	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24 JK	3	-	1	17	1	8	-	-	-	-	-	-	-
25 - 34 JK	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
35 - 44 JK	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
45 - 54 JK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - 64 JK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=> 65 JK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	1	1	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0

AANTAL WEEKSTATEN 637 WAARVAN GECORRIGEERD 155 MET 0192 RAPPORTERINGSDAGEN.

tabel 2d

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
4E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

PROVINCIE GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (1-ACHTIG ZIEKTEBEELD)		TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN		ADV.-GEB.-REG. 1E MAAL OVUL RENN OVERIGE ADVIEZEN		MOR- NING AFTER PIL		MOR- NING AFTER PIL		VERZ TOT ABOR TUS		ABORT.-PROV LEGE NIET ARTIS L.A.		
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
GR+FR+DR	7121	7161	14282	86	63	74	57	134	95	56	1	29	15	-	11	6	7
OV+GLD+ZYP	14461	14748	29208	223	212	218	107	156	132	83	9	37	23	12	20	12	7
UTR+NH+ZH	33512	35779	69291	121	115	118	68	120	95	102	5	24	15	13	13	7	6
ZLD+NB+LIM	15965	16659	32624	283	242	262	97	149	124	93	14	35	25	14	16	7	7
TOTAAL	71060	74346	145403	174	158	166	81	135	109	92	8	30	19	12	15	8	7

tabel 2d(vervolg)

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
4E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

PROVINCIE GROEP	CONSULT DOOR GEBRUIKER ZELF		DRUGGEBRUIK HERH. CONSULT		AANTAL PATIENTEN		(VERMOEDEN OP) KINDERMISHANDELING . TER KENNIS GEB. VAN VERTROUWENSARTS DOOR ANDEREN	
	M	V	M	V	M	V	M	V
GR+FR+DR	3	1	2	-	-	-	-	-
OV+GLD+ZYP	2	-	1	14	-	7	1	0
UTR+NH+ZH	0	1	1	0	1	1	-	-
ZLD+NB+LIM	1	2	1	-	1	1	1	0
TOTAAL	1	1	3	1	2	0	0	0

AANTAL WEEKSTATEN 637 WAARVAN GECORRIGEERD 155 MET 0192 RAPPORTERINGS-DAGEN.

tabel 3d

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
4E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIE GROEP	POPULATIE			INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD)			TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN			ADV.-GEB.-REG. 1E MAAL DYUL REMH OVERIGE ADVIEZEN			MOR- NING AFTER PIL		MOR- NING AFTER PIL		ABORT.-PROV LEGE NIET ARTIS L.A.	
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	M	V	M	V
A1-A4	16666	16458	33123	269	278	274	99	139	119	75	9	37	23	9	19	5	5	-
B1-B3+C1-C4	35777	37862	73638	120	88	104	74	132	104	99	5	26	16	10	8	7	4	0
C5	18617	20026	38644	194	189	191	81	136	110	91	11	31	21	20	25	12	11	-
TOTAAL	71060	74346	145405	174	158	166	81	135	109	92	8	30	19	12	15	8	7	0

tabel 3d(vervolg)

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
4E KWARTAAL 1973 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIE GROEP	CONSULT DOOR GEBRUIKER ZELF			DRUGGEBRUIK (VERMOEDEN OP) KINDERMISHANDELING . TER KENNIS.GEB. VAN VERTROUWENSARTS DOOR ANDEREN			1E CONSULT HERH. CONSULT			AANTAL PATIENTEN DOOR UZELF			AANTAL PATIENTEN DOOR ANDEREN		
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T
A1-A4	1	-	0	1	-	0	-	1	1	-	1	0	-	-	-
B1-B3+C1-C4	1	1	1	5	0	3	0	-	0	-	-	-	-	-	-
C5	1	2	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1
TOTAAL	1	1	1	3	1	2	0	0	0	-	0	0	0	0	0

AANTAL WEEKSTATEN 637 WAARVAN GECORRIGEERD 155 MET 0192 RAPPORTERINGSDAGEN.

Tabel 4

Aantal patiënten met influenza(-achtig ziektebeeld), per week en per 10 000, 1973 en 1974 (1e kwartaal)

Week Nr. 1973	Provinciegroep				Urbanisatiegroep			Nederland
	A	B	C	D	1	2	3	
1	131	115	81	167	121	108	124	115
2	95	60	51	85	83	55	77	66
3	33	40	30	66	52	32	47	41
4	31	27	20	41	31	23	33	27
5	16	19	12	35	21	13	27	19
6	6	19	9	24	10	12	18	14
7	5	14	8	19	9	7	18	11
8	9	11	5	16	9	7	12	9
9	5	10	4	19	13	5	13	9
10	4	8	4	19	15	7	9	9
11	3	8	4	27	13	6	15	10
12	1	9	4	28	16	4	17	10
13	19	9	5	21	17	4	17	11
14	7	6	5	21	13	5	12	9
15	5	10	6	15	12	5	14	9
16	10	5	5	12	7	5	13	7
17	4	3	4	12	8	3	10	6
18	1	6	3	14	9	6	5	6
19	2	4	4	14	6	3	12	7
20	1	4	2	10	6	3	6	4
21	1	8	3	11	8	3	9	6
22	1	4	3	8	8	2	5	4
23	2	6	4	15	9	5	8	7
24	14	5	5	14	13	4	10	8
25	6	4	4	11	7	3	8	6
26	5	7	7	14	11	8	7	9
27	3	10	4	7	5	7	6	6
28	6	6	6	9	2	7	11	6
29	-	9	2	10	8	3	8	6
30	5	5	2	3	4	2	5	3
31	5	5	2	5	4	4	3	3
32	2	3	3	8	8	2	4	4
33	1	4	2	7	4	2	6	3
34	2	6	2	9	8	3	4	4
35	-	7	2	13	11	3	6	6
36	1	8	6	9	6	6	7	6
37	2	10	6	7	6	5	10	6
38	6	11	6	6	8	5	10	7
39	5	11	5	15	16	5	9	8
40	6	15	9	21	19	9	13	12
41	3	19	7	19	30	7	14	12
42	10	16	8	18	22	6	18	12
43	13	10	5	19	18	7	12	10
44	7	10	8	19	20	6	12	10
45	7	18	6	16	21	6	10	11
46	5	19	7	20	25	7	12	12
47	2	15	6	17	19	5	14	11
48	3	14	6	15	16	6	11	9
49	4	13	6	26	21	7	15	12
50	8	19	8	30	24	7	20	15
51	3	16	11	26	25	9	17	15
52	2	39	32	15	27	28	25	27

Week Nr. 1974	Provinciegroep				Urbanisatiegroep			Nederland
	A	B	C	D	1	2	3	
1	5	45	26	31	31	23	35	28
2	25	56	29	40	47	30	38	36
3	54	91	34	51	58	44	44	49
4	75	103	52	67	100	57	73	71
5	81	54	54	132	118	71	67	78
6	67	78	40	75	116	44	41	58
7	24	27	35	69	52	38	39	39
8	7	22	18	42	30	20	26	24
9	27	19	13	38	32	14	27	22
10	14	17	14	56	34	18	29	25
11	12	20	11	53	21	18	33	23
12	9	13	6	35	18	10	22	15
13	9	9	8	29	17	9	17	13

Provinciegroep

- A. Groningen, Friesland en Drenthe
 B. Overijssel, Gelderland en Zuidelijke
 IJsselmeerpolders
 C. Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland
 D. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Urbanisatiegroep

1. Plattelandsgemeenten
 2. Gemeenten met stedelijk karakter
 tezamen met verstedelijke platte-
 landsgemeenten
 3. Gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Tabel 5


Aantal patiënten met influenza(-achtig ziektebeeld), naar leeftijdsgroep en geslacht, per week en per 10 000, 52e week 1973 tot en met 11e week 1974

Week Nr.	Leeftijdsgroep										Nederland
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	
M a n n e n											
52(1973)	61	59	34	20	20	20	16	18	29	20	28
1(1974)	15	39	26	31	62	19	29	31	19	28	29
2	47	47	44	45	40	29	35	36	44	29	38
3	52	100	97	66	50	29	35	69	39	18	53
4	77	174	161	108	64	34	45	53	39	13	73
5	94	200	125	100	50	47	57	59	47	29	76
6	98	102	72	70	52	36	51	56	47	33	60
7	56	74	56	51	28	28	29	44	26	25	40
8	34	28	25	24	17	20	26	25	22	21	24
9	36	20	17	30	29	18	17	19	21	8	21
10	43	23	16	38	28	23	25	13	30	22	25
11	25	29	20	38	24	20	28	27	16	11	24
Totaal	638	895	693	621	464	319	395	461	361	257	491
V r o u w e n											
52(1973)	24	58	34	19	27	12	17	41	11	27	27
1(1974)	25	20	25	26	18	27	35	35	21	31	27
2	31	46	27	54	27	18	41	31	39	35	34
3	36	90	91	67	32	26	39	46	29	27	46
4	81	169	116	88	53	45	47	54	37	38	69
5	116	190	160	97	61	31	59	55	45	33	81
6	65	102	99	46	38	45	39	52	49	35	55
7	59	74	58	42	24	25	33	37	29	28	39
8	31	37	27	22	14	10	21	33	18	22	23
9	36	31	16	25	20	18	28	24	12	17	22
10	32	20	23	31	28	20	23	26	20	21	24
11	26	21	19	24	20	27	21	27	17	12	22
Totaal	562	858	695	541	362	304	403	461	327	326	469
T o t a a l											
52(1973)	43	59	34	20	24	14	17	35	11	24	27
1(1974)	20	29	25	29	39	23	32	33	20	30	28
2	39	46	36	49	33	23	38	34	42	32	36
3	44	95	94	67	40	27	37	58	34	23	49
4	78	171	139	98	58	40	46	53	38	27	71
5	105	195	143	99	55	39	58	57	46	31	78
6	81	102	85	58	45	41	45	54	48	34	58
7	57	74	57	47	26	27	31	41	28	27	39
8	33	32	26	23	15	15	23	29	20	21	24
9	36	26	17	28	24	18	23	22	16	13	22
10	37	22	19	35	28	21	24	20	25	21	25
11	26	25	19	31	22	23	24	27	16	12	23
Totaal	599	876	694	584	409	311	398	463	344	295	480


FIGUUR 1
PEILSTATIONS
 continue morbiditeits registratie
 1973



FIGUUR 2
 Aantal patiënten met influenza (-achtig ziektebeeld) per week en per 10.000, 1973-1974 (1e kwartaal)




FIGUUR 2 (vervolg)




FIGUUR 3


Aantal patiënten met influenza(-achtig ziektebeeld) naar leeftijdsgroep en geslacht, per 10.000 tijdens influenza-epidemie 1973/1974 (52e week 1973 tot en met 11e week 1974



FIGUUR 4
 Aantal patiënten aan wie een tranquillizer werd voorgeschreven, per provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000, 1973.




FIGUUR 5.
 Aantal patiënten aan wie een tranqilizer werd voorgeschreven, naar leeftijds-
 groep en geslacht, per 10.000, 1973




FIGUUR 6
Aantal primaire consulten inzake ovulatie remmer, per
provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 vrouwen, 1970-1973

AANTAL CONSULTEN




FIGUUR 7


Aantal primaire consulten inzake ovulatie­remmer, naar leeftijdsgroep, per 10.000 vrouwen, 1970-1973.



FIGUUR 8
Aantal overige primaire consulten inzake geboorteregeling,
per provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 mannen, 1970-1973




FIGUUR 9
 Aantal overige primaire consulten inzake geboorteregeling, per provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 vrouwen, 1970-1973




FIGUUR 10

Aantal overige primaire consulten inzake geboorteregeling, naar leeftijdsgroep, per 10.000 mannen, c.q. vrouwen, 1970-1973




FIGUUR 11

Aantal vrouwen aan wie de morning-after-pill werd voorgeschreven, per leeftijds- provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 vrouwen, 1972-1973




FIGUUR 12
Aantal verzoeken om abortus, per provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 vrouwen,
1970-1973




FIGUUR 13

Aantal verzoeken om abortus, per leeftijdsgroep, per 10.000 vrouwen, 1970-1973




FIGUUR 14
 Aantal gevallen van abortus provocatus, lege artis, per leeftijds-, provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 vrouwen, 1971-1973




FIGUUR 15

Aantal verzoeken om abortus en aantal gevallen van abortus provocatus naar leeftijdsgroep, per 10.000 vrouwen, 1971-1973



FIGUUR 16

Aantal verrichte sterilisaties bij de man, per leeftijds-, provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 mannen, 1972-1973



57 | 74