

Nederlands Huisartsen Instituut
Postbus 2570 - 3500 GN Utrecht
Mariahoek 4 - tel. (030) 31 99 46

NIV 117(74)

CONTINUE MORBIDITEITS REGISTRATIE PEILSTATIONS JAARVERSLAG 1974



bibliotheek
drieharingsiraat 6
postbus 1568
3500 bn utrecht
tel 030 2729 614/615
fax 030 2729720

INHOUD	Pagina
Voorwoord	5
Inleiding	7
Spreiding der peilstationartsen over Nederland	9
De praktijkpopulaties	10
Te melden ziektebeelden en andere informatie	11
- De weekstaat	11
- De melding van individuele ziektegevallen	12
Verwerking der gegevens op de weekstaat	12
Bijeenkomst peilstationartsen	13
Enige resultaten met betrekking tot de weekrapportage over 1974	15
- Influenza(-achtig ziektebeeld)	16
- Leeftijds- en geslachtsverdeling	17
- Vaccinatietoestand	17
- Tranquillizers voorgeschreven	18
- Leeftijds- en geslachtsverdeling	19
- Adviezen geboorteregeling (primaire consulten)	20
- Voor de eerste maal ovulatieremmer voorgeschreven	20
- Leeftijdsverdeling	21
- Overige primaire adviezen inzake geboorteregeling	22
- Leeftijds- en geslachtsverdeling	23
- Morning-after-pill voorgeschreven	23
- Leeftijdsverdeling	24
- Verzoek om abortus	25
- Leeftijdsverdeling	26
- Abortus provocatus	27
- Leeftijdsverdeling	28
- Abortus provocatus versus verzoek om abortus	28
- Sterilisatie van de man	30
- Leeftijdsverdeling	30
- Sterilisatie van de vrouw	31
- Leeftijdsverdeling	32

- Consult rookverslaving	32
- Leeftijds- en geslachtsverdeling	33
- (Vermoeden op) kindermishandeling	34
Extrapolatie van enkele gevonden frequenties op de Nederlandse bevolking	36
Algemene opmerkingen	39
Bijlagen 1 - 2	40-43
Tabellen 1a - 5	44-61
Figuren 1 - 19	62-80

VOORWOORD

Hierbij heb ik de eer, u het vijfde jaarverslag van het project Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations aan te bieden.

Het bevat vooral gegevens over het pil-gebruik, de sterilisatie, de abortus provocatus, de morning-after-pill, e.d.

Hoewel de verkregen gegevens met enige voorzichtigheid gehanteerd moeten worden, zijn enige belangrijke conclusies:

het aantal verzoeken om abortus en het aantal uitgevoerde abortus provocatus in 1974, zijn gedaald, van 24 000 (1973) naar 19 000 resp. van 21 000 (1973) naar 15 000 per jaar. De incidentie van het pilgebruik is de laatste twee jaar gelijk gebleven (+ 300 000) en vertoont zelfs een lichte daling in 1974.

In de noordelijke provincies en in de plattelandsgemeenten, werden landelijk gezien lagere frequenties gevonden dan in de overige provincies en urbanisatiegroepen; al is er wel sprake van een "inhaal-groei" in deze gebieden.

Er is een toename van het pilgebruik op jongere leeftijd.

De sterilisatie bij mannen neemt nog steeds toe. Geëxtrapolerd op de Nederlandse bevolking, zijn 31 000 mannen in 1974 in Nederland gesteriliseerd (vrouwen 24 000).

Ook de morning-after-pill wordt steeds meer voorgeschreven (46 000), vooral in de leeftijd van 15-19 jaar.

Nieuwe meldingen in 1974 waren: consult rookverslaving en sterilisatie ingrepen bij de vrouw.

Ik hoop dat u dit verslag met vele belangrijke gegevens voor de volksgezondheid met genoeg zult lezen en verder onderzoek zal stimuleren.

C.P. Bruins, arts

Voorzitter Programmacommissie Peilstations

CONTINUE MORBIDITEITS REGISTRATIE PEILSTATIONS

Jaarverslag 1974

INLEIDING:

De Continue Morbiditeitsregistratie door een landelijk netwerk van peilstations heeft thans de eerste fase van haar bestaan afgesloten. Gedurende de proefperiode van vijf jaren (1970 - 1974) werden over een aantal volksgezondheidsaspecten gedurende kortere of langere tijd tal van belangwekkende gegevens verzameld.

Enkele van deze gegevens, geëxtrapoleerd op de Nederlandse bevolking, bleken verrassend goed overeen te stemmen met de resultaten van onderzoek dat elders heeft plaatsgevonden. Hieruit mag echter niet de conclusie getrokken worden, dat de gepeilde informatie zonder meer als representatief voor de Nederlandse situatie beschouwd mag worden. Daarvoor is de groep peilstationartsen te selectief gekozen. De resultaten die door middel van deze registratiemethode werden verkregen zullen, wanneer zij althans belangrijk genoeg worden geacht, door speciaal daarop gericht onderzoek op hun representativiteit moeten worden getoetst. De opzet en werkwijze der peilstations (zie jaarverslag 1970) houden in, dat een dergelijk diepgaand onderzoek niet zonder dat aan het project zelf schade wordt berokkend, kan worden ingepast in het peilstationproject. De programmacommissie is van mening dat in de gegevens welke door de peilstations in de achter ons liggende periode werden verzameld, boeiend materiaal voorhanden is dat tot nadere analyse en toetsing door wetenschappelijk onderzoek uitdaagt. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan de Instituten voor Huisartsgeneeskunde en Sociale Geneeskunde in ons land.

Op grond van de ervaring welke met deze Continue Morbiditeitsregistratie tot dusverre werd opgedaan, ligt het in de bedoeling met ingang van 1 januari 1976 het peilstationproject een permanent

karakter te geven en aan het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne volledige subsidiëring van dit project te vragen. Bij de uitvoering van het project zullen evenals voorheen het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Stichting Nederlands Huisartsen Instituut nauw samenwerken. Het Preventiefonds dat sinds de aanvang van dit project de belangrijke subsidiëring ten aanzien van de honorering van de deelnemende artsen voor haar rekening heeft genomen, werd bereid gevonden dit nog tot 1 januari 1976 voort te zetten.

De programmacommissie heeft in 1974 driemaal vergaderd. In de samenstelling van de programmacommissie is geen verandering gekomen.¹⁾

- 1) *Programmacommissie* : C.P.Bruins, arts (voorzitter)^{a)}
W.M.J.van Duyne, arts^{b)}
H.O.Sigling, arts^{c)} (Dr A.P.Oliemans, plaats-
vervangend lid^{c)})
- Coördinatoren* : R.Drion, arts^{b)}
T.E.Halbertsma, arts^{c)}
- Financiële deskundigen* : A.Schaap^{b)}
Mr M.H.B.Thissen^{c)}
- Adviseurs* : Prof.Dr J.C.van Es^{d)}
Dr M.J.Hartgerink^{f)}
- Projectleider* : Dr H.Bijkerk^{e)}

a) *Nederlands Huisartsen Instituut*

b) *Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne*

c) *Stichting Nederlands Huisartsen Instituut*

d) *Instituut voor Huisartsgeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht*

e) *Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid*

f) *Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde te Leiden*

Mevrouw G.A.M. Wolters-Wernert heeft met ingang van 20 december 1974 haar functie als secretaresse beëindigd. Zij werd als zodanig opgevolgd door mevrouw A.C.A.M. van Welie-Verweij, die reeds voor halve dagen voor het project werkzaam was.

Spreading der peilstationartsen over Nederland (figuur 1)

Een peilstation in Amsterdam is met ingang van 1 januari 1974 opgeheven. In de overige peilstations hebben zich enkele kleine mutaties voltrokken (overname van de praktijk, vorming van combinatiepraktijk).

Het aantal deelnemende huisartsen - 58 - is vergeleken met 1973 (56 artsen) wat toegenomen. De reden hiervan ligt in de toeneming van het aantal combinatiepraktijken.

Bijlage 1 geeft een overzicht van de huisartsen die in 1974 aan het peilstationproject hebben deelgenomen.

Het volgende overzicht geeft een verdeling van het aantal peilstationartsen per provincie- en urbanisatiegroep in de jaren 1970 - 1974:

Provinciegroep	Aantal deelnemende artsen				
	1974	1973	1972	1971	1970
A. Groningen, Friesland en Drenthe	8 ¹⁾	8 ¹⁾	7 ²⁾	7 ²⁾	7 ²⁾
B. Overijssel, Gelderland en Zuidelijke IJsselmeerpolders	10 ²⁾	10 ²⁾	9 ²⁾	10 ²⁾	10 ²⁾
C. Utrecht, Noord- en Zuid-Holland	27 ⁶⁾	25 ⁴⁾	23 ²⁾	23 ²⁾	22
D. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg	13 ²⁾	13 ²⁾	12	13	14
Nederland	58	56	51	53	53

Urbanisatiegroep ^{#)}	Aantal deelnemende artsen				
	1974	1973	1972	1971	1970
1. Plattelandsgemeenten	12 ²⁾	12 ²⁾	11 ²⁾	12 ²⁾	10 ²⁾
2. Gemeenten met een stedelijk karakter tezamen met verstedelijkte plattelandsgemeenten	30 ⁷⁾	28 ⁵⁾	25 ³⁾	26 ³⁾	28 ²⁾
3. Gemeenten met 100 000 of meer inwoners	16 ³⁾	16 ²⁾	15	15	15
Nederland	58	56	51	53	53

Waaronder:

- 1) 1 combinatiepraktijk met 3 artsen
- 2) 1 combinatiepraktijk met 2 artsen
- 3) 2 combinatiepraktijken met 2 artsen
- 4) 3 combinatiepraktijken met 2 artsen
- 5) 3 combinatiepraktijken met 2 artsen en 1 combinatiepraktijk met 3 artsen
- 6) 6 combinatiepraktijken met 2 artsen
- 7) 5 combinatiepraktijken met 2 artsen en 1 combinatiepraktijk met 3 artsen

Van de 51 bij de aanvang in 1970 aanwezige peilstations blijken er 42(82%) gedurende de vijf jaren als zodanig te hebben gefunctioneerd; van de 58 peilstationartsen in 1974 hebben 40(69%), vijf jaren aan het peilstationproject deelgenomen.

De praktijkpopulaties

Er heeft in 1974 geen integrale telling van de praktijkpopulaties plaatsgevonden.

^{#)} *Typologie van de Nederlandse gemeente naar urbanisatiegraad, 31 mei 1960 (Centraal Bureau voor de Statistiek)*

Te melden ziektebeelden en andere informatie

De weekstaat (bijlage 2)

De vragen op de weekstaat voor 1974 werden door de programmacommissie als volgt vastgesteld:

1. Nieuwe gevallen van influenza (-achtig ziektebeeld) ^{x)}
2. Tranquillizer voorgeschreven
3. Advies geboorteregeling (uitsluitend primaire consulten)
4. Consult inzake rookverslaving
5. Sterilisatie van de man verricht
6. Sterilisatie van de vrouw verricht
7. Morning-after-pill voorgeschreven
8. Verzoek om abortus
9. Abortus provocatus
10. (Vermoeden op) kindermishandeling

Evenals in vorige jaren wordt in principe uitgegaan van een "week"-rapportage gedurende de periode van maandag tot en met vrijdag. De uitzonderingen hierop zijn: sterilisatie van de man of van de vrouw verricht, morning-after-pill voorgeschreven, verzoek om abortus, abortus provocatus en consulten terzake van kindermishandeling, waarbij ook over zaterdag en zondag wordt gerapporteerd.

- ^{*)} Deze moeten voldoen aan de volgende criteria (Pel, 1965):
- a. Een acuut begin, dus hoogstens een prodromaal stadium van drie tot vier dagen (inclusief preëxistente luchtweginfecties op een niet ziekmakend niveau).
 - b. De infectie moet gepaard gaan met een temperatuursverhoging van tenminste 38° rectaal.
 - c. Tenminste één van de volgende symptomen moet aanwezig zijn: hoest, coryza, rauwe keel, frontale hoofdpijn, retrosternale pijn, myalgiën.
- Pel, J.Z.S. (1965) Proefonderzoek naar de frequentie en de aetiologie van griepachtige ziekten in de winter 1963 - 1964. *Huisarts en Wetenschap* 8,321.

De melding van individuele ziektegevallen

Op 1 januari 1976 zal de 2-jaars follow-up periode van alle patiënten met een hartinfarct, een acute cerebrovasculaire aandoening of een epileptiform beeld, verstreken zijn. Het ligt in het voornemen dat op het Nederlands Huisartsen Instituut de verwerking en analyse van deze gegevens, inclusief die van de patiënten met angineuze klachten, in 1976 ter hand zal worden genomen.

Verwerking der gegevens op de weekstaat

Dit verslag bevat de resultaten van de weekstaat over 1974. De gegevens werden verwerkt door de stafafdeling Epidemiologie en Informatica van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

Er worden als routine drie tabellen geproduceerd:

1. Het aantal patiënten per geslacht naar leeftijdsgroep
2. Het aantal patiënten per geslacht naar provinciegroep
3. Het aantal patiënten per geslacht naar urbanisatiegroep

De tabellen 1, 2 en 3 worden per kwartaal ten behoeve van de rapportage uitgedraaid. Tabel 1 wordt bovendien ook nog per peilstation ten gerieve van de deelnemende artsen geproduceerd.

De tabellen 1, 2 en 3 worden ten behoeve van de surveillance, vooral met betrekking tot het influenza-achtig ziektebeeld, ook per week geproduceerd. Met uitzondering van de per peilstation verstrekte informatie, zijn de gegevens per 10 000 van de praktijkpopulatie uitgedrukt (frequentie). De frequenties zijn op hele getallen afgerond. Bij een frequentie onder de 0.5 per 10 000 inwoners is deze afgerond tot "0". Indien geen enkel geval werd gerapporteerd is dit aangegeven met "-". In principe meldt een peilstation over 5 dagen per week. In de praktijk blijkt echter dat in sommige weken over minder dagen wordt gerapporteerd of helemaal niet (ziekte, vakantie etc.). De gegevens van de artsen die 0, 1 of 2 dagen van de week hebben gerapporteerd worden niet verwerkt, terwijl de betrokken

populaties van deze praktijken voor de berekening van de frequenties niet worden meegeteld.

De gegevens van de praktijken waar over 3, 4 of 5 dagen is gerapporteerd worden echter wel verwerkt, waarbij de aantallen welke betrekking hebben op influenza (-achtige ziektebeelden), tranquillizers voorgeschreven en adviezen geboorteregeling, worden gecorrigeerd met een correctiefactor van respectievelijk 1.67, 1.25 of 1, zodat een theoretische volledige "week" rapportage wordt bereikt. De gegevens betreffende de overige rubrieken blijven ongecorrigeerd. De kwartaalstaten worden opgebouwd uit de (gecorrigeerde) weekcijfers, waarbij de frequenties worden berekend op de gemiddeld in het kwartaal aanwezige populatie.

Bijeenkomst peilstationartsen

Op 26 januari 1974 heeft in het Jaarbeurs Congres- en Vergadercentrum in Utrecht een bijeenkomst plaatsgevonden, waaraan door 28 peilstationartsen en leden van de programmacommissie werd deelgenomen. Deze tweede bijeenkomst werd evenals de eerste in 1972 als zeer positief door de aanwezigen ervaren.

De heer J.P. Dopheide, socioloog, die in 1973 als wetenschappelijk medewerker aan het peilstationproject verbonden was, gaf enkele voorlopige resultaten met betrekking tot het longitudinale onderzoek inzake angineuze klachten. Uit de discussie kwam naar voren, dat het beter zou zijn geweest om het longitudinale onderzoek te beperken tot één ziektebeeld in plaats van de vier onderzoeken in vrijwel dezelfde periode. De meeste deelnemers waren van mening dat het peilstationproject zich niet leent voor dergelijk onderzoek. Dat neemt niet weg dat peilstationartsen hun medewerking op facultatieve grondslag aan een dergelijk onderzoek toezegden.

Uitvoerig werd van gedachten gewisseld over de wijze waarop het peilstationproject grotere bekendheid zou moeten krijgen. Afgezien

van het verspreiden op ruime schaal, wordt het van groot belang geacht dat over de resultaten van de Continue Morbiditeitsregistratie door peilstations ook op andere wijze en zo mogelijk door deelnemers van het project zelf, zal worden gepubliceerd ¹⁾.

De belangrijkste conclusie die uit deze bijeenkomst kan worden getrokken is de mening van alle aanwezigen om het peilstationproject na 31 december 1974 voort te zetten.

De primaire taak zal zijn de rapportage door middel van de weekstaat.

1) Sindsdien zijn enkele artikelen verschenen van de hand van de voorzitter van de programmacommissie:
Bruins, C.P. (1975). Peilstations. *T.Soc.Geneesk.*, 53, 121
Nederlands Huisartsen Instituut (1974). Vier jaar continue morbiditeitsregistratie in de huisartspraktijk door middel van peilstations. *Huisarts en Wetenschap*, 17, 407

ENIGE RESULTATEN MET BETREKKING TOT DE WEEKRAPPORTAGE OVER 1974¹⁾

In het kader van dit jaarverslag wordt niet beoogd een volledige analyse van het materiaal te geven.

De volgende kwartaaltabellen zijn hierbij ingesloten:

Tabellen 1a, 1b, 1c en 1d: het aantal patiënten per 10 000 van de leeftijdsgroep²⁾.

Tabellen 2a, 2b, 2c en 2d: het aantal patiënten per 10 000 van de provinciegroep.

Tabellen 3a, 3b, 3c en 3d: het aantal patiënten per 10 000 van de urbanisatiegroep.

Bij de bespreking der tabellen worden de volgende afkortingen of codes gebruikt:

- Influenza voor influenza (-achtig ziektebeeld)
- A voor provinciegroep Groningen, Friesland en Drenthe (noordelijke provincies)
- B voor provinciegroep Overijssel, Gelderland en Zuidelijke IJsselmeerpolders (oostelijke provincies)
- C voor provinciegroep Utrecht, Noord- en Zuid-Holland (westelijke en centrale provincies)
- D voor provinciegroep Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (zuidelijke provincies)
- 1 voor de urbanisatiegroep A₁ - A₄ (plattelandsgemeenten)
- 2 voor de urbanisatiegroep B₁ - B₃, C₁ - C₄ (gemeenten met stedelijk karakter tezamen met verstedelijkte plattelandsgemeenten)
- 3 voor de urbanisatiegroep C₅ (gemeenten met 100 000 of meer inwoners)

1) De tabellen uitsluitend met letters aangegeven zijn teksttabellen. De met Arabische cijfers aangeduide tabellen zijn met de bijlagen en de figuren achter de tekst opgenomen

2) In deze tabellen en daarvan afgeleide teksttabellen is altijd sprake van leeftijdsspecifieke frequenties

Influenza (-achtig ziektebeeld)

Tabel 4 en figuur 2 geven het aantal nieuwe gevallen van influenza per 10 000 inwoners per week, per provincie- en per urbanisatiegroep¹⁾.

De influenza-epidemie 1973/1974 werd reeds in het jaarverslag 1973 beschreven.

Influenza-epidemie 1974/1975

Evenals de epidemie 1973/1974 nam de incidentie toe in de laatste week van het jaar (30 patiënten per 10 000 inwoners) tegen een gemiddelde incidentie van 16 patiënten per 10 000 inwoners in de twee voorgaande maanden.

De top van de epidemie valt in de 4e - 5e week van 1975. Voor het gehele land ligt de top bij een incidentie van 90 patiënten per 10 000 inwoners in de 4e week.

De hoogste incidenties worden waargenomen in de noordelijke en oostelijke provincies (respectievelijk 151 en 152 patiënten per 10 000), gevolgd door de zuidelijke provincies met 89 patiënten per 10 000. De kleinste top wordt - in de 3e - 4e week 1975 - bereikt in het midden en westen van het land (64 patiënten per 10 000).

In de plattelandsgemeenten blijken de wekelijkse incidenties gedurende de epidemie duidelijk hoger te liggen dan in de overige gemeenten.

Deze epidemie blijkt te zijn veroorzaakt door een influenzavirus dat nauw verwant is aan de A/Port Chalmers/1/73 stam. Het verloop van de epidemie heeft vrijwel hetzelfde patroon als de epidemie van 1973/74 welke door een influenza B-virusstam werd veroorzaakt.

1) *Onder incidentie c.q. frequentie wordt hier en elders in de tekst verstaan de frequentie per 10 000 inwoners (c.q. mannen of vrouwen)*

Leeftijds- en geslachtsverdeling

De leeftijds- en geslachtsverdeling geven tabel 5 en figuur 3. Hierbij is uitgegaan van de periode waarin de wekelijkse incidenties duidelijk verhoogd zijn: 52e week 1974 tot en met de 8e week 1975. Van een significant geslachtsverschil is geen sprake. Tijdens de influenza B-epidemie 1973/1974 vielen in vergelijking met de oudere leeftijdsgroepen de duidelijk hogere incidenties in de jongere leeftijdsgroepen op. De hoogste totaalrequentie viel in die periode in de leeftijdsgroep 5 - 9 jaar. Het valt dan ook op dat tijdens de influenza-epidemie 1974/1975 de verschillen tussen de totaalfrequenties in de onderscheidene leeftijdsgroepen veel kleiner zijn dan tijdens de epidemie 1973/1974. De hoogste totaalfrequenties worden in de leeftijdsgroepen 35 - 44 en 45 - 54 jaar waargenomen: respectievelijk 569 en 503 per 10 000 van die bevolkingsgroep. De laagste frequenties vallen in de leeftijdsgroepen 10 - 14 en ≥ 65 jaar: respectievelijk 402 en 380 per 10 000 van die bevolkingsgroep.

Vaccinatioetoestand

In de weekstaat voor 1975 is de categorie influenza (-achtig ziektebeeld) gesplitst in twee rubrieken: gevaccineerd en niet-gevaccineerd (tegen influenza).

Indien per leeftijdsgroep en geslacht het aantal tegen influenza gevaccineerden wordt uitgedrukt in procenten van het totale aantal patiënten met influenza in de desbetreffende groep dan valt het volgende op.

In de eerste plaats is geen geslachtsverschil te constateren. In de tweede plaats blijft het percentage gevaccineerden voor de

leeftijdsgroepen jonger dan één jaar tot en met 25 - 34 jaar constant op een zelfde niveau: 2 - 3 %. Daarna nemen de percentages met het stijgen van de leeftijd duidelijk toe. Voor de leeftijdsgroepen 35 - 44, 45 - 54, 55 - 64 en \geq 65 jaar zijn deze percentages respectievelijk 5, 8, 9 en 17.

Daar geen gegevens bekend zijn over het totale aantal tegen influenza gevaccineerden per peilstationpraktijk en de diagnose influenza bovendien in de meeste gevallen niet virologisch of serologisch is bevestigd mogen uiteraard uit bovenstaande gegevens geen conclusies getrokken worden met betrekking tot de beschermende werking van de vaccinatie tegen influenza.

Tranquillizers voorgeschreven

De kwartaalcijfers met betrekking tot het voorschrijven van tranquillizers in 1974 uit de tabellen 1a t/m 3d zijn getotaliseerd en met die van 1973 in tabel a en figuur 4 weergegeven.

Tabel a

Aantal patiënten aan wie tranquillizer werd voorgeschreven per provincie- en urbanisatiegroep, per 10 000, 1973 - 1974

	<i>Provinciegroep</i>				<i>Urbanisatiegroep</i>			<i>Nederland</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
<i>1973</i>	<i>474</i>	<i>551</i>	<i>573</i>	<i>621</i>	<i>563</i>	<i>532</i>	<i>641</i>	<i>572</i>
<i>1974</i>	<i>411</i>	<i>566</i>	<i>419</i>	<i>533</i>	<i>574</i>	<i>426</i>	<i>476</i>	<i>469</i>

Evenals in 1972 en 1973 werd volstaan met een éénmalige rapportering in 1974 van patiënten aan wie tranquillizers werden voorgeschreven. De melding betrof uitsluitend patiënten aan wie librium, meprobaat,

nobrium, seresta of valium werd voorgeschreven.

De indicatie waarop een tranquillizer werd voorgeschreven is niet vermeld.

In het jaarverslag 1973 werd geconcludeerd dat in 1973 een daling is opgetreden ten aanzien van het voorschrijven van de voornoemde tranquillizers. Deze daling heeft zich in 1974 voortgezet: 469 per 10 000 tegen 572 per 10 000 in 1973.

De daling is in alle provincie- en urbanisatiegroepen waar te nemen. Een uitzondering hierop maken de oostelijke provincies (groep B) en de plattelandsgemeenten (groep 1) waar de frequenties vergeleken met 1973 vrijwel gelijk zijn gebleven.

Leeftijds- en geslachtsverdeling

De leeftijds- en geslachtsverdeling geven tabel b en figuur 5.

Tabel b

Aantal patiënten aan wie tranquillizers werd voorgeschreven naar leeftijdsgroep en geslacht per 10 000, 1974

	<i>leeftijdsgroep</i>										
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	<i>Totaal</i>
<i>Mannen</i>	26	43	46	156	349	449	636	600	575	405	346
<i>Vrouwen</i>	48	69	56	347	617	583	1036	1029	976	828	587
<i>Totaal</i>	38	55	51	253	493	517	839	816	782	642	469

De leeftijds- en geslachtsverdeling verschillen niet essentieel met die in 1972 en 1973: een duidelijk overwegen van het aantal vrouwelijke patiënten, waarbij het opvalt dat de frequentie bij de vrouwen reeds vanaf de leeftijdsgroep 15 - 19 belangrijk hoger is dan die bij mannen.

Terwijl de top in 1973 bij de mannen en de vrouwen in de leeftijds-
groep 45 - 54 wordt gevonden, ligt de top in 1974 voor beide ge-
slachten in de leeftijdsgroep 35 - 44: respectievelijk 636 en 1036
patiënten per 10 000 mannen c.q. vrouwen.

Adviezen geboorteregeling (primaire consulten)

De rubriek "adviezen geboorteregeling" valt uiteen in twee onderde-
len: "Voor de eerste maal ovulatieremmer voorgeschreven" en "overi-
ge consulten".

Voor de eerste maal ovulatieremmer voorgeschreven

In tabel c zijn de totaal frequenties per 10 000 van alle vrouwen
per provincie- en urbanisatiegroep over 1970 tot en met 1973 samen-
gevat (vergelijk figuur 6).

Tabel c

Aantal primaire consulten inzake ovulatieremmer per provincie- en
urbanisatiegroep, per 10 000 van alle vrouwen, 1970 - 1974

	<i>Provinciegroep</i>				<i>Urbanisatiegroep</i>			<i>Nederland</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1970	194	278	408	351	235	327	446	345
1971	186	294	417	443	246	396	418	374
1972	283	411	489	497	390	448	506	454
1973	342	407	487	481	393	470	479	457
1974	373	434	458	427	365	480	421	435

In 1973 kwam een einde aan de stijging van de jaarlijkse frequentie.
In 1974 blijkt de frequentie weer wat te zijn afgenomen. Dit geldt
voor het midden, westen en zuiden van het land en voor de urbanisa-

tiegroepen 1 en 3. In de noordelijke en oostelijke provincies is de frequentie echter nog toegenomen.

De nivellering van de frequenties, welke reeds in het jaarverslag 1973 werd opgemerkt, heeft zich in 1974 duidelijk voortgezet: in vrijwel alle provincie- en urbanisatiegroepen naderen de frequenties dicht die voor het gehele land (435). Een uitzondering hierop maken de noordelijke provincies en de plattelandsgemeenten waar nog duidelijk lagere frequenties worden gevonden.

Leeftijdverdeling

In tabel d (vergelijk figuur 7) zijn de leeftijdsspecifieke frequenties met betrekking tot de primaire consulten ovulatieregger per 10 000 vrouwen voor de jaren 1970 - 1974 gegeven.

Tabel d

Aantal primaire consulten inzake ovulatieregger naar leeftijdsgroep, per 10 000 vrouwen, 1970 - 1974

	<i>Leeftijdsgroep</i>					
	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54
1970	6	585	1248	815	311	93
1971	7	784	1402	794	328	71
1972	6	999	1534	1012	459	109
1973	19	1302	1500	892	427	119
1974	24	1408	1317	785	409	155

In de leeftijdsgroepen 10 - 14 en 15 - 19 nemen de frequenties nog duidelijk toe. Door de vrij sterke afname van de frequentie in de leeftijdsgroep 20 - 24 is deze groep door de 15 - 19 jarigen van de eerste plaats gedrongen. De in 1973 reeds gesignaleerde daling van de frequenties in de leeftijdsgroepen 25 - 34 en 35 - 44 heeft zich

in 1974 voortgezet, terwijl die in de categorie van 45 - 54 jaar weer is toegenomen.

Overige primaire adviezen inzake geboorteregeling

Tabel e geeft de totaal frequenties per 10 000 van alle mannen, c.q. vrouwen voor 1970 - 1974 met betrekking tot de overige primaire consulten inzake geboorteregeling, per provincie- en urbanisatiegroep (vergelijk ook figuren 8 en 9).

Tabel e

Aantal overige primaire consulten inzake geboorteregeling per provincie- en urbanisatiegroep, per 10 000 van alle mannen c.q. vrouwen, 1970 - 1974

	<i>Provinciegroep</i>								<i>Urbanisatiegroep</i>						<i>Nederland</i>	
	<i>A</i>		<i>B</i>		<i>C</i>		<i>D</i>		<i>1</i>		<i>2</i>		<i>3</i>		<i>M</i>	<i>V</i>
	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>		
1970	10	62	17	95	7	76	24	121	15	56	16	94	9	100	14	91
1971	12	44	16	129	29	99	68	193	23	103	43	125	24	123	34	120
1972	7	18	15	123	22	104	64	197	11	84	26	125	47	139	30	123
1973	24	102	36	145	22	87	50	161	38	108	25	123	41	113	33	117
1974	14	88	30	124	15	65	55	195	35	116	21	111	31	102	27	110

Het aantal consulten per 10 000 van alle mannen c.q. vrouwen is in 1974, vergeleken met het jaar daarvoor, wat afgenomen. Deze daling is, met uitzondering van de zuidelijke provincies en de plattelandsgemeenten, in alle provincie- en urbanisatiegroepen waar te nemen. In de zuidelijke provincies blijken de frequenties, die in 1973 duidelijk waren gedaald, in 1974 vrijwel hetzelfde peil van de jaren 1971 en 1972 te hebben bereikt.

Leeftijds- en geslachtsverdeling

In tabel f is een overzicht gegeven van de leeftijdsspecifieke frequenties, 1970 - 1974 (vergelijk figuur 10).

Tabel f

Aantal overige consulten inzake geboorteregeling naar leeftijdsgroep per 10 000 mannen c.q. vrouwen, 1970 - 1974

	<i>Leeftijdsgroep</i>									
	<i>15 - 19</i>		<i>20 - 24</i>		<i>25 - 34</i>		<i>35 - 44</i>		<i>45 - 54</i>	
	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>
1970	11	69	30	225	41	268	18	143	14	36
1971	37	160	65	329	53	291	116	198	28	53
1972	43	130	70	309	56	315	81	236	9	40
1973	22	153	63	243	66	281	92	251	28	61
1974	30	196	36	204	59	260	79	207	24	64

Belangrijke verschuivingen hebben zich met betrekking tot de leeftijds- en geslachtsverdeling in 1974 in vergelijking met 1973 niet voorgedaan.

Evenals in de jaren 1971 t/m 1973 worden voor de mannen de hoogste frequenties in de leeftijdsgroep 35 - 44 gevonden (in 1970 in de leeftijdsgroep 25 - 34). Bij de vrouwen vallen in de jaren 1970 en 1972 t/m 1974 de hoogste frequenties in de leeftijdsgroep 25 - 34 (in 1971 in de leeftijdsgroep 20 - 24).

Morning-after-pill voorgeschreven

Tabel g geeft de frequentie inzake het voorschrijven van de morning-after-pill, 1972 - 1974, per provincie- en urbanisatiegroep (vergelijk ook figuur 11).

Tabel g

Aantal vrouwen aan wie de morning-after-pill werd voorgeschreven, per provincie- en urbanisatiegroep, per 10 000 van alle vrouwen, 1972 - 1974

	<i>Provinciegroep</i>				<i>Urbanisatiegroep</i>			<i>Nederland</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1972	34	42	55	68	45	41	81	53
1973	29	69	57	67	62	47	79	59
1974	59	86	55	85	76	51	94	68

De morning-after-pill werd in 1974 duidelijk meer voorgeschreven dan in 1973: respectievelijk aan 68 en 59 vrouwen per 10 000 van alle vrouwen.

Deze toename is in alle provincie- en urbanisatiegroepen waarneembaar. Een uitzondering hierop maken het midden en het westen van het land waar de frequentie in de jaren 1972 - 1974 stabiel is gebleven.

Leeftijdsverdeling

Tabel h geeft de leeftijdsverdeling van de totaalfrequenties inzake het voorschrijven van de morning-after-pill, 1972 - 1974 (vergelijk figuur 11).

Tabel h

Aantal vrouwen aan wie de morning-after-pill werd voorgeschreven naar leeftijdsgroep, per 10 000 vrouwen, 1972 - 1974

	<i>Leeftijdsgroep</i>					
	<i>10 - 14</i>	<i>15 - 19</i>	<i>20 - 24</i>	<i>25 - 34</i>	<i>35 - 44</i>	<i>45 - 54</i>
<i>1972</i>	<i>2</i>	<i>148</i>	<i>150</i>	<i>117</i>	<i>67</i>	<i>7</i>
<i>1973</i>	<i>7</i>	<i>190</i>	<i>196</i>	<i>94</i>	<i>66</i>	<i>18</i>
<i>1974</i>	<i>2</i>	<i>266</i>	<i>171</i>	<i>104</i>	<i>78</i>	<i>34</i>

In de periode 1972 - 1974 is de frequentie in alle leeftijdsgroepen van 15 - 54 jaar, vooral in de leeftijdsgroep 15 - 19, toegenomen. Deze 15 - 19 jarigen nemen in 1974 met een frequentie van 266 per 10 000 vrouwen van die leeftijdsgroep de eerste plaats in.

Verzoek om abortus

Het aantal verzoeken om abortus per 10 000 van alle vrouwen, respectievelijk per provincie- en urbanisatiegroep, 1970 - 1974, is in tabel i samengevat (vergelijk figuur 12).

Tabel i

Aantal verzoeken om abortus per provincie- en urbanisatiegroep, per 10 000 van alle vrouwen, 1970 - 1974

	<i>Provinciegroep</i>				<i>Urbanisatiegroep</i>			<i>Nederland</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
<i>1970</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>44</i>	<i>24</i>	<i>9</i>	<i>22</i>	<i>55</i>	<i>29</i>
<i>1971</i>	<i>31</i>	<i>35</i>	<i>45</i>	<i>53</i>	<i>24</i>	<i>40</i>	<i>62</i>	<i>43</i>
<i>1972</i>	<i>20</i>	<i>31</i>	<i>48</i>	<i>45</i>	<i>20</i>	<i>30</i>	<i>76</i>	<i>41</i>
<i>1973</i>	<i>18</i>	<i>38</i>	<i>41</i>	<i>30</i>	<i>26</i>	<i>28</i>	<i>55</i>	<i>36</i>
<i>1974</i>	<i>30</i>	<i>32</i>	<i>27</i>	<i>30</i>	<i>32</i>	<i>20</i>	<i>42</i>	<i>28</i>

De in 1972 reeds gesignaleerde daling heeft zich in 1974 voortgezet. Dit geldt met name in het midden en het westen van ons land en de urbanisatiegroepen 2 en 3. De frequenties in de verschillende provinciegroepen en in urbanisatiegroep 1 lijken zich rond het landelijk gemiddelde (28) te stabiliseren.

Leeftijdverdeling

De leeftijdsspecifieke frequenties per 10 000 vrouwen met betrekking tot het aantal verzoeken om abortus, 1970 - 1974, is in tabel j gegeven (vergelijk figuur 13).

Tabel j

Aantal verzoeken om abortus naar leeftijdsgroep, per 10 000 vrouwen, 1970 - 1974

	<i>Leeftijdsgroep</i>					
	<i>10 - 14</i>	<i>15 - 19</i>	<i>20 - 24</i>	<i>25 - 34</i>	<i>35 - 44</i>	<i>45 - 54</i>
<i>1970</i>	<i>2</i>	<i>80</i>	<i>68</i>	<i>66</i>	<i>46</i>	<i>4</i>
<i>1971</i>	<i>10</i>	<i>102</i>	<i>108</i>	<i>97</i>	<i>62</i>	<i>11</i>
<i>1972</i>	<i>2</i>	<i>122</i>	<i>84</i>	<i>87</i>	<i>72</i>	<i>10</i>
<i>1973</i>	<i>-</i>	<i>87</i>	<i>100</i>	<i>68</i>	<i>59</i>	<i>9</i>
<i>1974</i>	<i>2</i>	<i>62</i>	<i>74</i>	<i>64</i>	<i>47</i>	<i>9</i>

Een daling van het aantal verzoeken om abortus blijkt zich in alle leeftijdsgroepen tussen 15 en 44 jaar te hebben gemanifesteerd. De eerste plaats blijft ingenomen door de leeftijdsgroep 20 - 24 jaar (74 per 10 000 vrouwen). De tweede en derde plaats worden gedeeld door de leeftijdsgroepen 15 - 19 en 25 - 34 jaar.

Abortus provocatus

Het aantal gevallen van abortus, lege artis opgewekt, per 10 000 van alle vrouwen en per provincie- en urbanisatiegroep, in de jaren 1971 tot en met 1974 is in tabel k gegeven (vergelijk figuur 14).

Tabel k

Aantal gevallen van abortus provocatus, lege artis, per provincie- en urbanisatiegroep per 10 000 van alle vrouwen, 1971 - 1974

	<i>Provinciegroep</i>				<i>Urbanisatiegroep</i>			<i>Nederland</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
<i>1971</i>	<i>19</i>	<i>26</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>13</i>	<i>16</i>	<i>38</i>	<i>22</i>
<i>1972</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>37</i>	<i>28</i>	<i>16</i>	<i>20</i>	<i>57</i>	<i>30</i>
<i>1973</i>	<i>21</i>	<i>25</i>	<i>34</i>	<i>33</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>57</i>	<i>31</i>
<i>1974</i>	<i>25</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>19</i>	<i>16</i>	<i>36</i>	<i>22</i>

Daar het aantal gevallen van niet lege artis opgewekte abortus in 1971 - 1973 zeer klein bleek te zijn is deze rubriek in 1974 komen te vervallen.

Het valt op dat het aantal vrouwen waarbij abortus lege artis werd opgewekt, vergeleken met 1973, duidelijk is gedaald en op hetzelfde niveau is gekomen als in 1971 (22 per 10 000 vrouwen).

De daling is in alle provincie- en urbanisatiegroepen vast te stellen. Uitzonderingen hierop zijn de noordelijke provincies waar (nog) een stijging van de frequentie valt te constateren en de plattelandsgemeenten waar een stabilisatie van de frequentie lijkt te zijn opgetreden.

Leeftijdverdeling

De leeftijdsspecifieke verdeling van het aantal gevallen van abortus provocatus (lege artis) per 10 000 vrouwen in de jaren 1971 - 1974 is in tabel 1 samengevat (vergelijk figuur 14).

Tabel 1

Aantal gevallen van abortus provocatus, lege artis, naar leeftijdsgroep, per 10 000 vrouwen, 1971 - 1974

	<i>Leeftijdsgroep</i>					
	<i>10 - 14</i>	<i>15 - 19</i>	<i>20 - 24</i>	<i>25 - 34</i>	<i>35 - 44</i>	<i>45 - 54</i>
1971	4	50	43	52	42	5
1972	2	69	68	70	49	11
1973	-	86	91	56	48	4
1974	2	54	36	56	40	2

Het valt op dat vooral in de leeftijdsgroepen 15 - 19 en 20 - 24 een aanzienlijke daling van de frequentie heeft plaatsgevonden. In de overige leeftijdsgroepen is de frequentie gelijk gebleven of slechts een weinig afgenomen.

Abortus provocatus versus verzoek om abortus, (figuur 15)

In het jaarverslag 1973 werden de leeftijdsspecifieke frequenties die betrekking hebben op het aantal gevallen van abortus provocatus als percentages uitgedrukt van het aantal verzoeken om abortus. Sinds 1971 bleken per leeftijdsgroep de percentages jaarlijks duidelijk toe te nemen. Dit geldt met name voor de leeftijdsgroepen 15 - 19 en 20 - 29. Deze resultaten leidden tot de veronderstelling dat in toenemende mate wordt tegemoet gekomen aan de wens om geaborteerd te worden.

In 1974 is aan deze tendens een einde gekomen (vergelijk tabel m en figuur 15).

Tabel m

Aantal verzoeken om abortus (A) en het aantal gevallen van abortus provocatus (B) naar leeftijdsgroep, per 10 000 vrouwen, 1971 - 1974^{*)}

	<i>Leeftijdsgroep</i>											
	<i>15 - 19</i>			<i>20 - 24</i>			<i>25 - 34</i>			<i>35 - 44</i>		
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>%</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>%</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>%</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>%</i>
1971	102	50	49	108	43	40	97	52	54	62	42	68
1972	122	69	57	84	68	81	87	70	80	72	49	68
1973	87	86	99	100	91	91	68	56	82	59	48	81
1974	62	54	87	74	36	49	64	56	88	47	40	85

^{*} De frequenties die betrekking hebben op het aantal gevallen van abortus provocatus zijn ook als percentages uitgedrukt van het aantal verzoeken om abortus.

Hoewel de desbetreffende percentages in de leeftijdsgroepen 25 - 34 en 35 - 44 in 1974, in vergelijking met 1973 nog zijn toegenomen blijkt dat niet het geval te zijn voor de leeftijdsgroepen 15 - 19 en 20 - 24 jaar. In de leeftijdsgroep 15 - 19 daalde het percentage van 99% in 1973 naar 87% in 1974. Bij de 20 - 24-jarigen is deze daling zelfs verrassend groot: van 91% in 1973 naar 49% in 1974. Een verklaring valt hiervoor moeilijk te geven. Het valt bijvoorbeeld moeilijk in te zien dat in de jongere leeftijdsgroepen de wens om geaborteerd te worden gemakkelijker kan worden omgebogen in een accepteren van de zwangerschap dan in de andere leeftijdsgroepen.

Sterilisatie van de man

Het aantal bij de man verrichte sterilisaties per 10 000 van alle mannen per provincie- en urbanisatiegroep, in de jaren 1972 - 1974 is in tabel n gegeven (vergelijk figuur 16).

Tabel n

Aantal verrichte sterilisaties van de man, per provincie- en urbanisatiegroep per 10 000 van alle mannen, 1972 - 1974

	<i>Provinciegroep</i>				<i>Urbanisatiegroep</i>			<i>Nederland</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1972	15	19	22	33	9	25	30	24
1973	11	26	41	61	22	38	59	40
1974	14	40	38	77	34	41	62	46

Het aantal bij de man verrichte sterilisaties blijkt ook in 1974 te zijn toegenomen. Deze toeneming valt met uitzondering van het midden en het westen van het land, in alle provincie- en urbanisatiegroepen waar te nemen.

De hoogste frequentie (77) valt in de zuidelijke, de laagste frequentie (14) in de noordelijke provincies. Bij de urbanisatiegroepen liggen de frequenties minder ver uit elkaar: respectievelijk 34 en 62 per 10 000 mannen in de plattelandsgemeenten en de gemeenten met 100 000 of meer inwoners.

Leeftijdverdeling

De leeftijdsspecifieke verdeling van het aantal verrichte sterilisaties per 10 000 mannen is in tabel o gegeven (vergelijk figuur 16).

Tabel o

Aantal verrichte sterilisaties van de man, naar leeftijdsgroep, per 10 000 mannen, 1972 - 1974

	<i>Leeftijdsgroep</i>					
	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64
1972	-	3	42	105	35	-
1973	-	16	79	179	40	4
1974	-	9	110	186	39	4

De hoogste frequentie valt evenals in 1972 en 1973 in de leeftijdsgroep 35 - 44 jaar: 186 verrichte sterilisaties per 10 000 mannen in 1974. Hierop volgen de leeftijdsgroepen 25 - 34 en 45 - 54 jaar met frequenties van respectievelijk 110 en 39.

Sterilisatie van de vrouw

Het aantal bij de vrouw verrichte sterilisaties per 10 000 van alle vrouwen per provincie- en urbanisatiegroep, in 1974, is in tabel p gegeven (vergelijk figuur 17).

Tabel p

Aantal verrichte sterilisaties van de vrouw, per provincie- en urbanisatiegroep per 10 000 van alle vrouwen, 1974

	<i>Provinciegroep</i>				<i>Urbanisatiegroep</i>			<i>Nederland</i>
	A	B	C	D	1	2	3	
1974	37	37	30	40	37	28	44	35

De landelijke frequentie met betrekking tot het aantal bij de vrouw verrichte sterilisaties (35) verschilt niet veel van de frequentie

in de provinciegroepen A, B en D. Slechts in het midden en het westen van het land blijkt de frequentie beduidend lager (30), dan die voor het gehele land te liggen. Dit geldt ook voor de urbanisatiegroep 2 met een frequentie van 28. In de gemeenten met 100 000 of meer inwoners valt de hoogste frequentie (44).

Leeftijdverdeling

De leeftijdsspecifieke verdeling van het aantal verrichte sterilisaties per 10 000 vrouwen is in tabel q gegeven (vergelijk figuur 17).

Tabel q

Aantal verrichte sterilisaties van de vrouw, naar leeftijdsgroep, per 10 000 vrouwen, 1974

	<i>Leeftijdsgroep</i>				
	<i>15 - 19</i>	<i>20 - 24</i>	<i>25 - 34</i>	<i>35 - 44</i>	<i>45 - 54</i>
1974	3	8	92	147	7

De hoogste frequentie (147) valt in de leeftijdsgroep 35 - 44, en wordt gevolgd door de leeftijdsgroep 25 - 34 met een frequentie van 92 sterilisaties per 10 000 vrouwen van die leeftijdsgroep. In de leeftijdsgroepen 15 - 19, 20 - 24 en 45 - 54 worden veel lagere frequenties gevonden.

Consult rookverslaving

Het gaat hierbij om patiënten die zich op eigen initiatief tot hun huisarts wenden met het verzoek om van het roken te worden afgeholpen. Deze patiënten werden in 1974 slechts éénmaal gemeld. Een herhalingsconsult of een consult maanden later werd niet gerapporteerd.

Het aantal consulten inzake rookverslaving per 10 000 van alle mannen c.q. vrouwen en per provincie- en urbanisatiegroep in 1974 is in tabel r gegeven (vergelijk figuur 18).

Tabel r

Aantal consulten inzake rookverslaving per provincie- en urbanisatiegroep per 10 000 van alle mannen c.q. per 10 000 van alle vrouwen, 1974

	<i>Provinciegroep</i>								<i>Urbanisatiegroep</i>						<i>Nederland</i>	
	<i>A</i>		<i>B</i>		<i>C</i>		<i>D</i>		<i>1</i>		<i>2</i>		<i>3</i>		<i>M</i>	<i>V</i>
	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>V</i>		
1974	21	8	47	14	9	8	34	19	42	13	15	10	22	12	24	12

De landelijke frequentie met betrekking tot het aantal consulten inzake rookverslaving is voor de mannen tweemaal zo hoog als voor de vrouwen: respectievelijk 24 en 12 consulten per 10 000 mannen c.q. vrouwen.

De hoogste frequenties worden in de oostelijke (respectievelijk 47 en 14) en zuidelijke (respectievelijk 34 en 19) provincies gevonden, alsmede in de plattelandsgemeenten (respectievelijk 42 en 13).

Zeer lage frequenties daarentegen worden gezien in het midden en het westen van het land (respectievelijk 9 en 8).

Leeftijds- en geslachtsverdeling

In tabel s is een overzicht gegeven van de leeftijdsspecifieke frequenties, 1974 (vergelijk figuur 19).

Tabel s

Aantal consulten inzake rookverslaving naar leeftijdsgroep en geslacht, per 10 000, 1974

	<i>Leeftijdsgroep</i>															
	10-14		15-19		20-24		25-34		35-44		45-54		55-64		≥ 65	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1974	1	-	18	15	41	21	51	21	35	25	42	12	18	2	2	1

Bij de mannen valt de hoogste frequentie (51) in de leeftijdsgroep 25 - 34, gevolgd door de leeftijdsgroepen 45 - 54 (42), 20 - 24 (41) en 35 - 44 (35).

Bij de vrouwen wordt de eerste tot en met de vierde plaats ingenomen door de leeftijdsgroepen 35 - 44 (25), 25 - 34 (21), 20 - 24 (21) en 15 - 19 (15).

(Vermoeden op) kindermishandeling

Het aantal gerapporteerde gevallen van kindermishandeling is zeer klein. De leeftijdsspecifieke frequenties zijn echter misleidend doordat zij gebaseerd zijn op zeer kleine populaties.

Om die reden zal hier, evenals in 1973, worden volstaan met het geven van absolute aantallen. Het volgende overzicht geeft het aantal gerapporteerde gevallen (vermoeden op) van kindermishandeling in 1974.

Aantal gevallen waarbij kindermishandeling werd vastgesteld of vermoed naar leeftijdsgroep, 1974 (absoluut).

	Leeftijdsgroep												Totaal
	< 1		1 - 4		5 - 9		10 - 14		15 - 19		Totaal		
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
Aantal gevallen	1	-	-	3	1	1	2	4	1	-	5	8	13
waarvan ter kennis gebracht van vertrouwensarts	-	-	-	3	1	1	1	1	-	-	2	5	7

Aantal gevallen waarbij kindermishandeling werd vastgesteld of vermoed naar provincie- en urbanisatiegroep, 1974 (absoluut)

Provinciegroep				Urbanisatiegroep			Nederland
A	B	C	D	1	2	3	
6 ¹⁾	3 ²⁾	3 ³⁾	1 ⁴⁾	3 ²⁾	3 ³⁾	7 ⁵⁾	13

Gemeld door:

- 1) 1 peilstation met 5 patiënten en 1 peilstation met 1 patiënt
- 2) 1 peilstation met 2 patiënten en 1 peilstation met 1 patiënt
- 3) 3 peilstations met elk 1 patiënt
- 4) 1 peilstation
- 5) 1 peilstation met 5 patiënten en 2 peilstations met elk 1 patiënt

Vertrouwensarts

Van de zeven patiënten zijn drie door anderen dan de arts zelf ter kennis gebracht van de vertrouwensarts. De overige vier patiënten zijn door de arts zelf ter kennis gebracht van de vertrouwensarts.

EXTRAPOLATIE VAN ENKELE GEVONDEN FREQUENTIES OP DE NEDERLANDSE BEVOLKING

Het volgende overzicht geeft een globale indruk van het aantal patiënten, consulten e.d. in Nederland, indien wordt uitgegaan van de frequenties, berekend uit de resultaten van de continue morbiditeitsregistratie door peilstations, met betrekking tot tranquilizers, geboorteregeling, morning-after-pill, abortus provocatus en sterilisatie bij de man, c.q. bij de vrouw.

Hierbij dient, evenals in de jaarverslagen 1972 en 1973 werd opgemerkt, niet uit het oog te worden verloren dat de peilstation-artsen een select gekozen groep zijn. In hoeverre de uitkomsten van de werkelijke situatie afwijken is dan ook niet zondermeer vast te stellen.

In het jaarverslag 1973 werd reeds opgemerkt dat de schatting van 21 000 in 1973 lege artis verrichte abortussen nagenoeg overeenkomt met het resultaat van een onderzoek dat in het kader van de Staatscommissie inzake het bevolkingsonderzoek is uitgevoerd.

Door de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid werd over mei 1974 een enquête gehouden naar de in de Nederlandse ziekenhuizen verrichte sterilisatie-ingrepen. De resultaten van deze enquête zijn gepubliceerd in Verslagen, Adviezen, Rapporten nr. 7 (1975) van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Extrapolatie van de over mei 1974 verzamelde gegevens naar het gehele jaar 1974 geeft 25 992 sterilisatie-ingrepen bij mannen en 20 688 sterilisatie-ingrepen bij vrouwen. De gegevens van de peilstations - respectievelijk 31 000 en 24 000 sterilisaties bij mannen en vrouwen in 1974 zijn hiermee niet in tegenspraak gezien de opmerking in de voornoemde publicatie, dat de resultaten slechts een minimum aan ingrepen in Nederland aanduiden.

Rubriek	Periode	Frequentie ¹⁾		Totaal	Nederland ²⁾		Totaal
		M	V		M	V	
<i>Tranquillizers</i>							
<i>voor eerste maal in die periode voorgeschreven</i>							
	2e-4e kwart. 1972	421	734	579	279000	488000	768000
	1973	426	712	572	284000	478000	766000
	1974	346	587	469	233000	397000	633000
<i>Primaire consulten inzake ovulatieremmer</i>							
	1970		345			225000	
	1971		374			246000	
	1972		454			302000	
	1973		457			307000	
	1974		435			294000	
<i>Overige consulten inzake geboorteregeling</i>							
	1970	14	91		9000	59000	
	1971	34	120		22000	79000	
	1972	30	123		20000	82000	
	1973	33	117		22000	79000	
	1974	27	110		18000	74000	
<i>Morning-afterpill voorgeschreven</i>							
	1972		53			35000	
	1973		59			40000	
	1974		68			46000	

(vervolg)

Rubriek	Periode	Frequentie ¹⁾		Totaal	Nederland ²⁾		Totaal
		M	V		M	V	
Aantal verzoeken om abortus	1970		29			19000	
	1971		43			28000	
	1972		41			27000	
	1973		36			24000	
	1974		28			19000	
Abortus provocatus	1971		22			14000	
	1972		30			20000	
	1973		31			21000	
	1974		22			15000	
Sterilisatie bij de man c.q. vrouw	1972	24				16000	
	1973	40				27000	
	1974	46	35			31000	24000

1) Aantal patiënten, consulten etc. per 10 000 mannen en/of vrouwen (gegevens peilstations)

2) Extrapolatie van de frequenties op de Nederlandse bevolking. Afgerond op duizendtallen

ALGEMENE OPMERKINGEN

1. De vragen op de weekstaat voor 1975 zijn door de programmacommissie als volgt samengesteld:
 - a. Nieuwe gevallen van influenza (-achtig ziektebeeld); gevaccineerd/niet-gevaccineerd
 - b. Nieuwe gevallen van mazelen
 - c. Advies geboorteregeling (uitsluitend primaire consulten)
 - d. Sterilisatie van de man verricht
 - e. Sterilisatie van de vrouw verricht
 - f. Morning-after-pill voorgeschreven
 - g. Verzoek om abortus
 - h. Abortus provocatus
 - i. Alcoholisme
 - j. Ulcus ventriculi/duodeni
 - k. Schedeltrauma in verkeer
 - l. Afgegeven verklaring voor andere woning

2. Suggesties die betrekking hebben op de vraagstelling van de weekstaten worden gaarne door de programmacommissie ontvangen en op hun waarde voorzover zij betrekking hebben op hun toepassing in dit project, beoordeeld.

Dr H.Bijkerk (projectleider)

Bijlage 1

Continue Morbiditeits Registratie Peilstations
1974

Deelnemende artsen

Naam:	Plaats:	Provincie:
A.A.E.E. Brockmöller [‡])	't Zandt	Groningen
F.H. Mulder	Groningen	Groningen
Chr. Schotanus [‡]) (tot 1-8-'74)	Oostermeer	Friesland
J. Vennema	Franeker	Friesland
S. Vriesinga [‡]) (vanaf 1-8-'74)	Oostermeer	Friesland
W.G. Blik [‡])	Schoonoord	Drente
H.W. Reinking/F.M. van Soest/ R.F. Sparenburg (comb. praktijk)	Assen	Drente
Th. J. van Dam	Swifterbant	Overijssel
Dr H.K. Muller	Kampen	Overijssel
H. Nap	Gramsbergen	Overijssel
R.C. Veldhuijzen van Zanten [‡])	Enter	Overijssel
J.E. Bekkering	Nijmegen	Gelderland
Th.M.G. van Berkestijn	Velp	Gelderland
J.H. de Boer/Dr J. van Noort (comb. praktijk) [‡])	Zelhem	Gelderland
J.P. van Dam	Nijmegen	Gelderland
Dr H. Mulder [‡])	Heerde	Gelderland
G.E. van de Burger [‡])	Linschoten	Utrecht
J. Hartog/F.K.A. Fokkema (comb. praktijk)	Amersfoort	Utrecht

Bijlage 1 (vervolg)

Deelnemende artsen

Naam:	Plaats:	Provincie:
P.J. Kromeich/J.A.J. van Poppe1 (comb.praktijk) (vanaf 1-1-'74)	Utrecht	Utrecht
J. Busquet	Alkmaar	Noord-Holland
C. den Hartoog ^{†)}	Broek in Waterland	Noord-Holland
A.A.M.E. Janssen	Heiloo	Noord-Holland
H.J. v.d. Leen	Hilversum	Noord-Holland
Dr P.A. Roorda	Haarlem	Noord-Holland
H.O. Sigling/Mw. A.J. Arbouw (comb. praktijk)	Amstelveen	Noord-Holland
Mw. P.J. Ypenburg-Visser	Amsterdam	Noord-Holland
H.L. van Amerongen/Mw.H.J.Haag (comb. praktijk)	Rotterdam	Zuid-Holland
Dr B.J.M.Aulbers/J.E.G.Nieuwkamer (comb. praktijk)	Delft	Zuid-Holland
J. Beunk	Maassluis	Zuid-Holland
Dr A.W. Bots ^{†)}	Voorhout	Zuid-Holland
G. Dorrenboom	Rotterdam	Zuid-Holland
G. van Gangelen	Sliedrecht	Zuid-Holland
J.B. Hugenholtz/J.W. de Haan (comb. praktijk)	Oegstgeest	Zuid-Holland
Dr A.P. Oliemans	Den Haag	Zuid-Holland
A.G. Stam	Dordrecht	Zuid-Holland
Th.J. van Stockum Jr.	Den Haag	Zuid-Holland
B.J. van Vianen	Den Haag	Zuid-Holland
R.J.P. Bauwens	Terneuzen	Zeeland
M. Reyerse	Middelburg	Zeeland

Bijlage 1 (vervolg)

Deelnemende artsen

Naam:	Plaats:	Provincie:
K.E.W. Ebeling-Koning	Eindhoven	Noord-Brabant
Dr H.A.M. Hoevenaars ^{‡)}	Uden	Noord-Brabant
R.J.F.M. Leijgraaf/A.F.A. van de Reepe (comb.praktijk) ^{‡)}	Etten	Noord-Brabant
S.H.H.M. v.d. Meer ^{‡)}	Rosmalen	Noord-Brabant
Dr J.P.C. Moors ^{‡)}	Rosmalen	Noord-Brabant
J.W.G.A. van Rens ^{‡)}	Oirschot	Noord-Brabant
A. Sluyters	Ravenstein	Noord-Brabant
Dr J.L.M.Raupp (vanaf 1-1-'74)	Eindhoven	Noord-Brabant
N.G.M. Courtens	Maastricht	Limburg
J.M.M. Hermans	Weert	Limburg

^{‡)} Apotheek-houdend

bijlage 2
Weekstaat t.b.v. centrale registratie

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS 1974

Proj. no.	Verlag jaar	Week no.	Code peilstations	Rapport dagen
M P	7 4			
1-4	5-6 7-8	9-12	13	

Regel no.	Leeftijdsgroep	Intenzia (-achtig) ziektebeeld		Tranquillizer ²⁾		Adviezen geboorte-regeling Voor de eerste maal		Consult ³⁾ rookverslaving ³⁾	Sterilisatie van de man verricht	Sterilisatie van de vrouw verricht	Morging-ster-pil voorgeschreven ⁴⁾	Verzoek om abortus	Abortus ⁵⁾ provocat ⁵⁾	Aantal patiënten ⁶⁾		Ter kennis gebracht van vertrouwensarts ⁷⁾					
		M	V	M	V	M	V							M	V						
01	< 1																				
02	1-4																				
03	5-9																				
04	10-14																				
05	15-19																				
06	20-24																				
07	25-34																				
08	35-44																				
09	45-54																				
10	55-64																				
11	≥ 65																				
3-4		14-16	17-19	20-21	22-23	24-25	26-27	28-29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Weeknummer:
 Opgemaakt d.d.:

- Aantal dagen gerapporteerd: 0 1 2 3 4 5
 (de voetnoot 1).
 5) Lega arts of niet lege arts vericht
 6) Een patiënt dient slechts éénmaal te worden gemeld. Herhaling van kindermishandeling wordt dus niet opgegeven indien de patiënt reeds eerder in 1974 werd gerapporteerd. Meldingen van kindermishandelingen worden slechts aan U zijn doorgegeven, dienen eveneens in de weekstaat te worden opgenomen.
 7) Betreft patiënten die in 1974 ter kennis zijn gebracht van de vertrouwensarts. Volstaan wordt met een éénmalige opgave per patiënt. Vervolgmeldingen aan de vertrouwensarts worden niet opgegeven.
 8) Door bijvoorbeeld maatschappelijk werkster, verpleegster e.a.

Tabel 1a
CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
1E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

LEEFTYDS- GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD			TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN			ADV.-GEB.-REG. 1E MAAL OVUL REMM OVERIGE ADVIEZEN			CONSULT ROOKVERSLAVING			STERILISATIE VERRICHT			
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T
< 1 JR	1060	1015	2075	547	621	583	9	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4 JR	5385	5323	10709	641	543	592	7	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9 JR	7102	6714	13817	841	833	837	8	22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14 JK	6719	6599	13318	708	635	672	15	23	19	3	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19 JR	6207	6257	12464	620	559	590	35	97	67	547	8	54	31	5	3	4	-	-
20 - 24 JR	6400	7465	13865	481	351	411	100	180	143	335	3	47	27	3	3	-	-	-
25 - 34 JR	11839	12293	24132	315	324	319	120	191	156	187	7	61	34	12	4	8	22	17
35 - 44 JR	8843	9131	17974	406	404	405	193	330	263	99	19	42	31	5	4	4	44	25
45 - 54 JR	7722	7774	15496	453	454	454	211	372	292	26	4	8	6	12	4	8	10	-
55 - 64 JR	5858	6198	12055	364	334	348	244	399	324	-	-	-	-	5	-	2	2	-
=> 65 JR	6119	7843	13961	250	311	284	141	310	236	-	2	-	1	2	-	1	-	-
TOTAAL	73254	76611	149865	494	459	476	111	202	157	106	5	25	15	5	2	4	10	6

Tabel Ia vervolg

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIENS
1E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

LEEF- TUS- GROEP	MORN. VERZ AFTER ABOR PIL TUS		ABOR TUS PROV.		(VERMOEDEN OP) KINDERWISHANDELING											
	V	V	V	V	AANTAL PATIENTEN DOOR UZELF				TER KENNIS GEC. VAN VERTROUWENSARTS DOOR ANDEREN				TOTAAL			
	V	V	H	V	T	M	T	H	V	T	M	V	T	M	V	T
< 1 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9 JR	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14 JR	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19 JR	48	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24 JR	43	15	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 34 JR	27	11	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 44 JR	22	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 - 54 JR	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - 64 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=> 65 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	16	5	4	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0

AANTAL WEEKSTATEN 628 WAARVAN SECORRIGEERD 132 MET 0208 RAPPORTERINGS-DAGEN.

Tabel 1b

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
2E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

LEEF- TYDS- GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (- ACHTIG ZIEKTEBEELD			TRANQUILLIZER VOOR- SCHREVEN			ADV.-GEB.-REG. 1E MAAL OVUL REMM OVERIGE ADVIEZEN			CONSULT ROOK- VERSLAVING			STERILISATIE VERRICHT			
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T
< 1 JR	930	900	1830	75	133	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4 JR	4760	4698	9458	229	228	228	6	15	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9 JR	6289	5935	12224	142	113	128	5	19	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14 JR	5884	5826	11711	36	51	44	5	7	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19 JR	5447	5458	10905	62	68	65	44	93	69	390	6	37	21	4	4	-	-	-
20 - 24 JR	5552	6410	11963	115	100	107	86	142	116	378	9	56	34	5	6	-	-	3
25 - 34 JR	10305	10639	20944	89	103	96	128	151	140	222	17	44	31	15	4	9	32	25
35 - 44 JR	7744	7956	15700	89	97	93	168	304	237	163	25	50	38	9	6	8	45	36
45 - 54 JR	6710	6707	13417	80	106	93	130	250	190	52	4	19	12	1	-	1	10	3
55 - 64 JR	5118	5378	10496	64	86	75	141	199	171	2	-	-	-	2	2	2	-	-
=> 65 JR	5367	6842	12209	89	82	85	84	190	143	-	-	-	-	-	1	1	-	-
TOTAAL	64107	66750	130857	97	101	99	85	146	116	129	7	23	16	5	3	4	12	9

Tabel 1b vervolg

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
2E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

LEEF- TUS- GROEP	MORN. VERZ. ABOR- TUS		(VERMOEDEN OP) KINDERHISHANDELING .										
	PIL	TUS	AANTAL PATIENTEN		DOOR UZELF		DOOR ANDEREN		TER KENNIS BEB. VAN VERTROUWENSARTS		DOOR ANDEREN		
	V	V	V	V	H	V	T	H	V	T	H	V	T
< 1 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4 JR	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-
5 - 9 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19 JR	82	9	9	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24 JR	34	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 34 JR	24	17	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 44 JR	15	18	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 - 54 JR	10	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - 64 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≥ 65 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	17	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AANTAL HEKSTATEN 636 WAARVAN SECORRIGEERD 295 MET 0563 RAPPORTERINGS-DAGEN.

Tabel 10

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
3E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

LEEFTYDS- GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD			TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN			ADV.GEB.-REG. 1E MAAL OVUL REHM OVERIGE ADVIEZEN			CONSULT ROOKVERSLAVING			STERILISATIE VERRICHT			
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T
< 1 JR	819	794	1613	110	176	143	12	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4 JR	4256	4226	8482	150	104	127	9	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9 JR	5642	5306	10948	90	104	97	21	11	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14 JR	5230	5208	10438	80	83	81	8	10	9	6	-	4	2	-	-	-	-	-
15 - 19 JR	4830	4881	9711	83	90	87	37	82	60	361	4	68	36	4	6	5	-	-
20 - 24 JR	4940	5766	10707	103	114	109	101	146	125	304	12	62	39	16	5	10	4	2
25 - 34 JR	9258	9671	18929	81	85	83	102	126	114	193	19	79	50	19	7	13	23	25
35 - 44 JR	6887	7163	14050	106	78	92	147	221	184	80	17	57	38	9	10	9	55	45
45 - 54 JR	5965	5989	11974	95	105	100	112	215	164	38	13	23	18	12	5	8	12	3
55 - 64 JR	4472	4732	9204	96	85	90	103	218	162	-	-	-	-	9	-	4	2	-
=> 65 JR	4606	5966	10572	85	62	72	93	198	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	56926	59702	116628	96	91	93	77	129	104	104	8	34	21	8	4	6	12	10

Tabel 1c (vervolg)

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
3E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

LEEFTYDS- GROEP	MORN. VERZ. ABOR AFTER ABOR TUS		(VERMOEDEN OP) KINDERMISHANDELING .																	
	PIL TUS	PROV.	AANTAL PATIENTEN DOOR UZELF					TER KENNIS GEB. VAN VETROUWENSARTS DOOR ANDEREN												
			V	V	H	T	M	V	T	H	M	V	T							
< 1 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9 JR	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14 JR	-	-	-	4	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19 JR	66	25	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24 JR	52	26	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 34 JR	32	20	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 44 JR	27	7	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 - 54 JR	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - 64 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≥ 65 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	20	9	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AANTAL MEKSTATEN 636 WAARVAN GECORRIGEERD 239 MET 0105 RAPPORTERINGS DAGEN.

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
4E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

LEEFTYDS- GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (4-ACHTIG ZIKTEREELD				TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN				ADV.GEB.-REG. 1E MAAL OVUL. REMM. OVERIGE ADVIEZEN				CONSULT ROOKVENSLAVING				STERILISATIE VERRICHT			
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	
< 1 JR	986	948	1935	254	338	295	-	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 - 4 JR	5063	5022	10085	316	269	293	4	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 - 9 JR	6682	6326	13007	189	193	191	9	17	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 - 14 JR	6281	6239	12520	151	139	145	18	16	17	6	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 - 19 JR	5821	5872	11692	225	233	229	40	75	57	310	12	37	25	5	2	3	-	3	-	3	2	
20 - 24 JR	5960	6957	12937	324	185	250	62	149	109	300	12	39	26	17	7	12	5	3	4	4	4	
25 - 34 JR	11074	11509	22563	236	202	218	99	115	107	183	16	76	47	5	6	5	33	25	29	25	29	
35 - 44 JR	8257	8564	16821	263	196	229	128	181	155	67	18	58	39	12	5	8	42	41	42	41	42	
45 - 54 JR	7201	7233	14433	233	191	212	147	192	170	39	3	14	8	17	3	10	7	1	4	4	4	
55 - 64 JR	5417	5735	11152	223	208	215	87	160	125	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
=> 65 JR	5657	7317	12974	193	183	187	87	130	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAAL	68417	71722	140139	235	200	217	73	110	92	96	7	28	18	6	3	4	12	10	11	10	11	

Tabél 1d (vervolg)

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
4E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

LEEFTIJD- GROEP	MORNL. VERZ. ARUP AFTER 160K PIL TUS		(VERKOEJEN OP) KINDERHSHANDELING *											
	TUS PROV.		AANTAL PATIENTEN DOOR UZELF						TEK KENNIS GEB. VAN VERTRUWENSARTS DOOR ANJEREN					
	V	V	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T
< 1 JR	-	-	10	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4 JR	-	-	-	4	2	-	4	2	-	-	-	-	-	-
5 - 9 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14 JR	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19 JR	70	15	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24 JR	42	19	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 34 JR	21	16	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 44 JR	14	13	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 - 54 JR	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - 64 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=> 65 JR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	15	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AANTAL WEEKSTATEN 635 WAARVAN GECORRIGERD 189 MET 0212 RAPPORTERINGSDAGEN.

Tabel 2a
CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
1E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

PROVINCIE GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIS ZIEKTEBEELD		TRANQUILLIZER VOORBESCHREVEN		ADV. GEB.-REG. 1E MAAL OVUL. REMM. OVERIGE ADVIEZEN		CONSULT ROOKVERSLAVING		STERILISATIE VERRICHT								
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V							
GR+FR+DR	6774	6837	13611	458	393	425	41	124	83	79	3	19	11	6	4	5	4	9	7
OV+GLD+ZYP	12826	13196	26021	556	518	537	140	196	169	98	5	28	17	6	3	5	9	6	7
UTR+NH+ZH	36117	38390	74507	339	333	336	102	199	152	107	2	15	9	4	2	3	8	4	6
ZLD+NB+LIM	17537	18189	35726	783	706	744	134	244	190	121	12	43	28	6	2	4	18	9	13
TOTAAL	73254	76611	149865	494	459	476	111	202	157	106	5	25	15	5	2	4	10	6	8

Tabel 2a vervolg

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
1E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

PROVINCIE GROEP	MORN. VERZ. ABOR AFTER ABOR PIL TUS		MORN. VERZ. ABOR TUS		AANTAL PATIENTEN DOOR UZELF		AANTAL PATIENTEN DOOR ANDEREN		(VERMOEDEN OP) KINDERHISHANDELING		TER KENNIS GEB. VAN VERTROUWENSARTS DOOR ANDEREN	
	V	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
GR+FR+DR	9	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OV+GLD+ZYP	23	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTR+NH+ZH	12	4	4	0	-	-	0	0	-	-	-	-
ZLD+NB+LIM	21	7	5	-	1	0	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	16	5	4	0	0	0	-	0	-	0	-	-

AANTAL WEEKSTATEN 628 WAARVAN GECORRIGEERD 132 MET 0206 RAPPORTERINGS-DAGEN.

Tabel 2b

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
2E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDEERD PER 10000

PROVINCIE GROEP	POPULATIE			INFLUENZA (-)ACHTIG ZIEKTEBEELD			TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN			ADV.GEB.+REG. 1E MAAL OVUL REHM OVERIGE ADVIEZEN			CONSULT ROOKVERSLAVING			STERILISATIE VEKRICHT			
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	
GR+FR+DR	6997	6582	13179	61	61	61	58	160	109	115	9	23	16	6	2	4	3	8	5
OY+GLD+ZYP	12097	12411	24508	139	156	148	106	184	145	139	9	26	18	12	3	7	8	8	8
UTR+NH+ZH	29670	31401	61072	49	53	51	76	135	106	140	5	19	12	2	3	2	12	10	11
ZLD+NB+LIM	15743	16356	32099	180	180	180	105	148	127	116	10	29	20	4	2	3	18	8	13
TOTAAL	64107	66750	130857	97	101	99	85	146	116	129	7	23	16	5	3	4	12	9	10

Tabel 2b vervolg

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
2E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDEERD PER 10000

PROVINCIE GROEP	MORN. VERZ. ABOR AFTER ABOR PIL TUS PROV.			(VERHOEDEN OP) KINDERHISHANDELING .			TER KENNIS GEB. VAN VERTROUWENSARTS DOOR UZELF DOOR ANDEREN												
	V	V	T	M	V	T	M	V	T										
GR+FR+DR	9	14	6	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OY+GLD+ZYP	18	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTR+NH+ZH	17	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZLD+NB+LIM	18	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	17	7	5	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2c

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
3E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

PROVINCIE GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD			TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN			ADV.-GEB.-REG. 1E MAAL OVUL REMM OVERIGE ADVIEZEN			CONSULT ROOKVERSLAVING			STERILISATIE VERRICHT				
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	
GR+FR+DR	4575	4642	9217	46	9	27	63	177	120	108	-	24	12	-	2	1	7	13	10
OY+GLD+ZYP	10901	11149	22050	137	136	137	128	132	130	98	9	37	23	21	6	14	13	7	10
UTR+NH+ZH	27415	29326	56741	41	41	41	61	125	94	108	4	17	11	1	2	2	8	8	6
ZLD+NB+LIH	14034	14585	28620	191	188	189	76	125	101	102	18	68	43	13	7	10	21	14	18
TOTAAL	56926	59702	116628	96	91	93	77	129	104	104	8	34	21	8	4	6	12	10	11

Tabel 2c (vervolg)

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
3E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

PROVINCIE GROEP	HORN. VERZ. ABOR AFTER ABOR PIL TUS		MORN. VERZ. ABOR AFTER ABOR PIL TUS		AANTAL PATIENTEN DOOR UZELF		AANTAL PATIENTEN DOOR ANDEREN		(VERHOEDEN OP) KINDERMISHANDELING		TER KENNIS GE3. VAN VERTROUWENSARTS DOOR ANDEREN		
	V	V	V	V	M	V	T	M	V	T	M	V	T
GR+FR+DR	26	4	9	2	4	3	2	2	-	-	-	-	-
OY+GLD+ZYP	30	13	4	-	1	0	-	-	-	1	0	-	-
UTR+NH+ZH	13	7	6	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
ZLD+NB+LIH	25	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	20	9	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

AANTAL WEEKSTATEN 636 WAARVAN GECORRIGEERD 239 MET 0105 RAPPORTERINGSDAGEN.

Tabel 2d

 CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
 4E KWARTAAL 1974 GESTAANDARDEERD PER 10000

PROVINCIE GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD		TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN		ADV.-GEB.-REGE. 1E MAAL OVUL REMM OVERIGE ADVIEZEN		CONSULT ROOKVERSLAVING		STEKILISATIE VERMIGT								
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T							
GR+FR+DK	5794	5878	11673	155	111	133	78	121	99	71	2	22	12	9	-	4	-	7	3
OV+GLD+ZYP	12761	13167	25927	332	252	292	128	117	122	99	7	33	20	8	2	5	10	16	13
UTR+NH+ZH	33495	35688	69183	117	109	113	41	92	67	103	4	14	9	2	1	2	10	8	9
ZLD+NB+LIM	16366	16989	33355	421	375	398	93	136	115	88	15	55	35	11	8	9	20	9	15
TOTAAL	66417	71722	140139	235	200	217	73	110	92	96	7	28	18	6	3	4	12	10	11

Tabel 2d (vervolg)

 CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
 4E KWARTAAL 1974 GESTAANDARDEERD PER 10000

PROVINCIE GROEP	MORN. VERZ. AHR AFTER ABOR PIL TUS		TUS PROV.		AANTAL PATIENTEN DUOK UZELF		TER KENNIS GEV. VAN VETROUWENSARTS DOOR ANDEREN		(VERMOEDEN OP) KINDERMISHANDELING .		AANTAL PATIENTEN DUOK UZELF		DOOR ANDEREN	
	V	V	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T
GR+FR+DK	15	5	7	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-
OV+GLD+ZYP	15	3	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTR+NH+ZH	13	9	5	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-
ZLD+NB+LIM	21	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	15	7	7	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-

Tabel 3a

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
1E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIE GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIG ZIENTEBEELD			TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN			ADV.-GEB.-REG.- 1E MAAL OVUL. REHM OVERIGE ADVIEZEN			CONSULT ROOKVERSLAVING			STERILISATIE VERRICHT				
	M	V	M	V	T	M	V	T	V	M	V	T	M	V	T	M	V	T	
A1-A4	15896	15768	31663	676	634	655	125	203	164	90	5	26	15	9	5	7	8	6	7
B1-B3+C1-C4	36576	38808	75383	413	369	390	106	191	150	116	5	27	16	4	2	3	9	5	7
C5	20783	22036	42818	498	491	495	110	222	167	101	5	20	13	3	1	2	14	7	11
TOTAAL	73254	76611	149865	494	459	476	111	202	157	106	5	25	15	5	2	4	10	6	8

Tabel 3a vervolg

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
1E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIE GROEP	MORN. VERZ. ABOR TUS		MORN. VERZ. ABOR TUS		(VERMOEDEN OP) KINDERMISHANDELING .			TER KENNIS GEB. VAN VERTROUWENSARTS DOOR ANDEREN				
	PIL	PROV.	V	M	V	T	M	V	T	M	V	T
A1-A4	21	6	3	-	1	0	-	-	-	-	-	-
B1-B3+C1-C4	13	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	17	5	5	1	-	0	-	0	-	0	-	-
TOTAAL	16	5	4	0	0	0	-	0	-	0	-	-

AANTAL WEEKSTATEN 628 NAARVAN GECORRIGEERD 132 MET 0208 RAPPORTERINGS-DAGEN.

Tabel 3b

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
2E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIE GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD		TRANQUILLIZER VOORRECHREVEN		ADV. GEB.-REG. 1E MAAL OVUL. OVERIGE ADVIEZEN		CONSULT ROOKVERSLAVING		STERILISATIE VERRICHT								
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T				
A1-A4	15719	15629	31348	164	191	178	110	179	145	113	15	20	18	10	1	5	6	8	7
B1-B3+C1-C4	32211	34132	66342	66	57	61	76	133	105	141	4	22	14	2	1	2	11	8	10
C5	16177	16989	33166	103	117	110	85	157	122	131	6	28	17	5	6	6	18	11	14
TOTAAL	64107	66750	130857	97	101	99	85	146	116	129	7	23	16	5	3	4	12	9	10

Tabel 3b vervolg

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
2E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIE GROEP	MORN. VERZ.- ABOR TUS		AANTAL PATIENTEN		TER KENNIS. GEB. VAN VEROEDEN OP) KINDERMISHANDELING - DOOR ANDEREN		DOOR UZELF		DOOR ANDEREN											
	V	TUS	M	V	T	M	V	T	M	V	T									
A1-A4	16	13	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1-B3+C1-C4	13	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	26	11	8	1	1	0	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	17	7	5	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3c

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
3E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIE GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD		TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN		ADV.GEB.-REG. 1E MAAL OVUL RENN OVERIGE ADVIEZEN		CONSULT ROOKVERSLAVING		STERILISATIE VERRIJCHT								
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V							
A1-A4	12632	12652	178	175	177	105	157	131	87	7	35	21	16	6	12	10	6	9	
B1-B3+C1-C4	28695	30501	58	44	51	66	106	86	117	6	34	21	3	4	4	9	6	8	
C5	15599	16550	32149	103	117	110	77	155	117	95	12	32	22	8	2	5	19	16	17
TOTAAL	56926	59702	116628	96	93	77	129	104	104	6	34	21	6	4	6	12	10	11	

Tabel 3c (vervolg)

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
3E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIEAFTER ABOR PIL TUS GROEP	MORN. VERZ. ABOR TUS PROV.		AANTAL PATIENTEN DOOR UZELF		AANTAL PATIENTEN DOOR ANDEREN		(VERMOEDEN OP) KINDERMISHANDELING		TER KENNIS GEB. VAN VERTROUWENSARTS									
	V	V	M	V	M	V	T	M	V	T								
A1-A4	21	10	8	-	1	0	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-
B1-B3+C1-C4	15	7	3	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	29	12	12	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	20	9	6	0	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

AANTAL WEEKSTATEN 636 WAARVAN GEKURRIGGEERD 239 MET 0105 RAPPORTERINGSJAGEN.

Tabel 3d

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
4E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIE GROEP	POPULATIE		INFLUENZA (-ACHTIG ZIEKTEBEELD		TRANQUILLIZER VOORGESCHREVEN		ADV.GEB.+KEG. 1E MAAL OVUL REMM OVEKIGE ADVIEZEN		CONSULT ROOKVERSLAVING		STERILISATIE VERRICHT								
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T				
A1-A4	14684	14716	29399	283	310	133	135	134	75	8	35	22	5	1	3	10	15	13	
B1-B3+C1-C4	34441	36579	71020	164	149	156	60	109	85	106	6	28	17	6	3	5	12	7	10
C5	19292	20428	39720	278	226	251	46	92	70	94	8	22	15	6	3	5	11	10	11
TOTAAL	68417	71722	140139	235	200	217	73	110	92	96	7	28	18	6	3	4	12	10	11

Tabel 3d (vervolg)

CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE PEILSTATIONS
4E KWARTAAL 1974 GESTANDAARDISEERD PER 10000

URBANISATIEAFTER PIL	MOKN. VERZ. ABOR TUS		TER KENNIS GEB. VAN VERTROUWENSARTS DOOR ANDEREN		AANTAL PATIENTEN DOOR UZELF		(VERMOEJEN OP) KINDERMISHANDELING												
	V	V	T	M	V	T	M	V	T										
A1-A4	18	3	3	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1-B3+C1-C4	10	5	6	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	22	14	11	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	15	7	7	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 4

Aantal patiënten met influenza(-achtig ziektebeeld), per week en per 10 000, 1974 en 1975 (1e kwartaal)

Week Nr. 1974	Aantal patiënten							Totaal
	Provinciegroep				Urbanisatiegroep			
	A	B	C	D	1	2	3	
1	5	45	26	31	31	23	35	28
2	25	56	29	40	47	30	38	36
3	54	91	34	51	68	44	44	49
4	75	103	52	87	100	57	73	71
5	81	54	54	132	118	71	67	78
6	67	78	40	75	116	44	41	58
7	24	27	35	69	52	36	39	39
8	7	22	18	42	30	20	26	24
9	27	19	13	38	32	14	27	22
10	14	17	14	56	34	18	29	25
11	12	20	11	53	21	18	33	23
12	9	13	6	35	18	10	22	15
13	9	9	8	29	17	9	17	13
14	6	14	7	23	22	6	20	13
15	1	10	3	11	9	4	8	6
16	2	11	3	22	14	5	12	9
17	3	12	4	15	14	6	6	8
18	1	11	5	11	11	6	7	7
19	2	15	6	12	17	4	7	8
20	-	9	5	15	11	5	10	8
21	7	10	3	8	11	2	10	6
22	9	11	3	11	10	4	8	7
23	17	13	5	16	18	7	8	9
24	5	13	3	10	11	4	7	6
25	7	7	2	11	13	3	2	6
26	4	11	1	12	16	3	3	6
27	6	14	3	12	15	4	10	8
28	-	18	3	9	15	4	8	8
29	3	4	1	8	7	2	6	4
30	-	5	2	8	-	3	8	3
31	2	9	1	2	8	1	4	3
32	1	9	3	7	8	3	5	5
33	2	4	2	7	7	2	4	4
34	-	10	2	15	17	3	5	6
35	-	15	2	14	23	5	5	8
36	3	9	3	18	18	4	8	8
37	-	14	6	23	19	7	11	11
38	5	9	5	26	14	5	14	9
39	6	12	5	32	21	6	15	12
40	7	17	8	19	17	8	16	12
41	3	16	9	34	27	11	21	17
42	9	11	7	32	24	10	17	15
43	9	19	6	25	15	10	17	13
44	13	19	8	33	21	8	30	18
45	8	15	6	33	12	9	25	14
46	14	21	6	26	28	12	10	16
47	8	32	6	23	32	10	6	15
48	8	23	4	33	19	9	21	15
49	11	24	5	42	25	12	21	17
50	13	26	12	41	28	14	25	21
51	9	33	13	29	30	16	20	20
52	18	44	23	29	33	29	18	30

Week Nr. 1975	Aantal patiënten							Totaal
	Provinciegroep				Urbanisatiegroep			
	A	B	C	D	1	2	3	
1	24	50	28	33	34	28	36	31
2	12	78	45	37	35	49	43	48
3	59	95	64	62	90	63	65	69
4	123	152	64	68	149	79	58	90
5	151	137	50	89	142	70	54	83
6	85	29	32	67	58	43	36	44
7	37	24	18	78	34	34	33	33
8	23	18	18	80	32	35	24	31
9	10	14	12	41	17	22	14	19
10	3	11	7	25	11	10	14	12
11	1	11	5	18	9	9	8	9
12	1	7	5	10	7	7	6	6
13	2	4	4	9	5	5	5	5

Provinciegroep

- A. Groningen, Friesland en Drenthe
 B. Overijssel, Gelderland en Zuidelijke IJsselmeerpolders
 C. Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland
 D. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Urbanisatiegroep

1. Plattelandsgemeenten
 2. Gemeenten met stedelijk karakter tezamen met verstedelijkte plattelandsgemeenten
 3. Gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Tabel 5

Aantal patiënten met influenza(-achtig ziektebeeld), naar leeftijdsgroep en geslacht, per week en per 10 000, 52e week 1974 tot en met 8e week 1975

Week Nr.	Leeftijdsgroep										Nederland
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	
M a n n e n											
52 (1974)	25	22	11	20	54	35	54	34	11	48	32
1 (1975)	22	19	9	28	35	44	46	48	27	26	31
2	68	42	35	51	62	52	46	65	47	38	50
3	103	86	68	56	51	78	94	66	54	33	69
4	106	100	109	85	82	90	102	110	88	50	92
5	89	74	82	56	93	78	103	96	111	55	85
6	48	39	47	43	48	51	59	65	33	31	47
7	23	25	34	32	29	44	37	33	34	22	32
8	30	36	22	38	35	38	37	27	29	32	33
Totaal	514	443	417	409	489	510	578	544	434	335	471
V r o u w e n											
52 (1974)	32	29	17	44	22	21	25	41	21	32	27
1 (1975)	26	33	12	28	45	28	31	37	41	28	30
2	49	44	32	51	50	50	40	70	43	36	46
3	85	68	64	71	62	69	103	70	46	55	69
4	66	90	103	92	60	89	118	85	84	70	86
5	100	80	71	90	66	86	107	77	79	57	82
6	38	44	39	41	42	39	48	27	38	55	41
7	32	21	27	48	32	39	40	26	36	38	34
8	23	18	19	25	35	34	47	25	30	42	31
Totaal	451	427	384	490	414	445	559	458	418	414	446
T o t a a l											
52 (1974)	28	25	14	32	37	28	39	38	16	39	30
1 (1975)	25	25	10	29	40	35	38	42	28	27	31
2	59	44	33	51	56	51	44	68	45	37	48
3	94	78	67	64	56	73	98	68	50	45	69
4	86	95	107	89	70	90	110	98	86	61	90
5	94	77	77	73	78	82	105	86	95	57	83
6	43	41	43	42	44	45	54	46	36	45	44
7	28	23	31	40	30	41	39	30	35	31	33
8	27	27	20	31	35	35	42	27	29	38	31
Totaal	484	435	402	451	446	480	569	503	420	380	459


FIGUUR 1

PEILSTATIONS
CONTINUE MORBIDITEITSREGISTRATIE
1974




E-I 18|75

Figuur 2 Aantal patiënten met influenza(-achtig ziektebeeld) per week en per 10 000, 1974-1975 (1ste kwartaal)




figuur 3

Aantal patiënten met influenza (-achtig ziektebeeld) naar leeftijdsgroep en geslacht, per 10.000 tijdens influenza - epidemie 1974 | 1975, (52^e week 1974 t/m 8^e week 1975)




Figuur 4 Aantal patiënten aan wie een tranquillizer werd voorgeschreven per provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000, 1973-1974




20|75

Figuur 5
Aantal
patienten


**Aantal patiënten aan wie een tranquillizer werd voorgeschreven,
naar leeftijdsgroep en geslacht, per 10.000, 1974**




Figuur 6 Aantal primaire consulten inzake ovulatie­remmer, per provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 vrouwen, 1970-1974




Figuur 7 Aantal primaire consulten inzake ovulatieregulerend middel, naar leeftijdsgroep, per 10.000 vrouwen, 1970-1974




Figuur 8 Aantal overige primaire consulten inzake geboorteregeling, per provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 mannen, 1970-1974




Figuur 9 Aantal overige primaire consulten inzake geboorteregeling, per provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 vrouwen, 1970-1974




Figuur 10 Aantal overige primaire consulten inzake geboorteregeling, naar leeftijdsgroep, per 10.000 mannen cq. vrouwen, 1970-1974.




Figuur 11 Aantal vrouwen aan wie de morgen-after-pill werd voorgeschreven, per leeftijds-, provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 vrouwen, 1972-1974



Figuur 12 Aantal verzoeken om abortus, per provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 vrouwen, 1970-1974





Figuur 13 Aantal verzoeken om abortus, per leeftijdsgroep, per 10.000 vrouwen, 1970-1974.




29/75


Figuur 14
Aantal gevallen **Aantal gevallen van abortus provocatus, per leeftijds-, provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 vrouwen, 1971-1974**




Figuur 15 Aantal verzoeken om abortus en aantal gevallen van abortus provocatus naar leeftijdsgroep, per 10.000 vrouwen, 1971-1974




Figuur 16 Aantal verrichte sterilisaties bij de man, per leeftijds-, provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 mannen, 1972-1974



Figuur 17 Aantal verrichte sterilisaties bij de vrouw, per leeftijds-, provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 vrouwen, 1974



Figuur 18 Aantal consulten inzake rookverslaving, per provincie- en urbanisatiegroep, per 10.000 mannen resp. vrouwen, 1974



Figuur 19 Aantal consulten inzake rookverslaving, naar leeftijdsgroep en geslacht, per 10.000, 1974

