

Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 9^e gegevensrapportage volwassenen (juli-december 2024)

Julie Penders, Christos Baliatsas, Mariëtte Hooiveld, Tessa Magnée, Michel Dückers, Mark Bosmans

In dit cijferoverzicht worden resultaten getoond van de kort-cyclische monitoring binnen de integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Doel van deze monitor is het bieden van een goede informatiebasis wat betreft de fysieke en mentale gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis, om lokale en regionale bestuurders te kunnen adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming. Deze kort-cyclische monitoring levert ongeveer vier keer per jaar een beperkte verzameling van geïnterpreteerde cijfers op. De hoge frequentie van verschijnen draagt zorg voor inzicht in de actuele situatie in Nederland.

De data waarop de cijfers in dit cijferoverzicht betrekking hebben komen van huisartspraktijken die deelnemen aan de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (Nivel Zorgregistraties) en richten zich op volwassenen (25 jaar en ouder). Daarnaast worden vragenlijsten uitgezet in representatieve panels. Beide datastromen worden ook gepresenteerd op een [RIVM-website](#).

Actuele cijfers gebruik huisartsenzorg

De coronapandemie heeft sinds maart 2020 grote gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd, zowel direct als indirect. Om deze in kaart te brengen heeft het Nivel cijfers omtrent huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende gezondheidsproblemen op een rijtje gezet, met gebruikmaking van gegevens van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. We richten ons hierbij op een aantal 'niet-specifieke' gezondheidsproblemen die een fysieke en/of mentale oorzaak kunnen hebben (het gaat zowel om gezondheidsproblemen die zijn geregistreerd bij episodes van aandoeningen, als om gezondheidsproblemen die niet aan een aandoening worden toegeschreven). Een deel van deze gezondheidsproblemen wordt door het RIVM genoemd als mogelijke langdurige klachten na het doormaken van een infectie met het coronavirus. Sinds 2022 zijn daar ook cijfers rondom suïcide(pogingen/gedachten) aan toegevoegd. De cijfers van kwartaal 3 en 4 (juli tot en met december) 2024 worden vergeleken met die van dezelfde periodes in eerdere jaren (2019, 2022 en 2023). Hierbij is onderscheid gemaakt in leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75+), geslacht en provincies (zie bijlage).

NB: het gaat bij de kort-cyclische monitoring altijd om momentopnames: het geeft een beeld van het welzijn en de problemen van (doelgroepen binnen) de Nederlandse bevolking op een bepaald punt in de tijd. Deze rapportage richt zich op de periode juli tot en met december. Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat men voorzichtig moet zijn met de interpretatie van gezondheidsproblemen die zeer weinig voorkomen, zoals in dit cijferoverzicht het geval is bij hartklachten en suïcide(pogingen). Hierbij kunnen kleine verschillen al tot grote schommelingen leiden.


Wat valt op in de periode juli-december 2024?

In deze paragraaf lichten we de meest opvallende resultaten uit de periode juli-december (kwartaal 3 en 4) 2024 toe.

Geheugen- en concentratiestoornissen

- Het aantal huisartsconsulten voor geheugen- en concentratiestoornissen lag in het derde kwartaal van 2024 (+23%) en het vierde kwartaal van 2024 (+20%) aanzienlijk hoger dan in dezelfde periodes in 2019. Dit patroon is vergelijkbaar met eerdere kwartalen in 2024.
- Over de jaren heen is een stijgende trend zichtbaar. In 2022 lag het aantal consulten al iets hoger dan in 2019, in 2023 nam dit verder toe, en in 2024 is opnieuw een toename te zien.
- De oudste leeftijdsgroep (75 jaar en ouder) had veruit de meeste huisartsconsulten voor deze gezondheidsproblemen, een patroon dat ook in eerdere jaren zichtbaar was.
- Hoewel vrouwen iets vaker huisartsconsulten hadden voor deze problemen dan mannen, is de toename sinds 2019 sterker bij mannen dan bij vrouwen.


Figuur 1 *Weekcijfers huisartsconsulten van geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen onder volwassenen (25 jaar en ouder).*



Slapeloosheid

- In het derde en vierde kwartaal van 2024 lag het aantal huisartsconsulten voor slapeloosheid respectievelijk 11% en 10% hoger dan in 2019. In de eerste twee kwartalen van 2024 waren de stijgingen iets groter (12% en 16% ten opzichte van 2019), met wat grotere wekelijkse fluctuaties in de prevalentie. De vrij plotselinge toename in het eerste halfjaar lijkt in de tweede helft van 2024 af te zwakken, waarbij de wekelijkse cijfers een stabiel patroon vertonen en dicht bij die van 2019 liggen.
- Deze stijgingen passen binnen een trend van een lichte jaarlijkse toename: in 2022 was het aantal consulten iets hoger dan in 2019, in 2023 nam dit verder toe, en in 2024 is opnieuw een kleine toename zichtbaar.
- Oudere leeftijdsgroepen hadden meer consulten voor slapeloosheid/andere slaapproblemen dan jongere groepen, een patroon dat consistent is met eerdere jaren.
- Vrouwen gingen iets vaker naar de huisarts met deze gezondheidsproblemen dan mannen.


Figuur 2 *Weekcijfers huisartsconsulten van slapeloosheid/andere slaapprognissen onder volwassenen (25 jaar en ouder).*



Benaauwdheid

- Het aantal huisartsconsulten voor benaauwdheid lag in het derde kwartaal van 2024 10% hoger en in het vierde kwartaal 11% hoger dan in dezelfde kwartalen in 2019.
- De stijging ten opzichte van 2019 in de periode juli-december 2024 was iets minder groot dan de stijging in januari-juni 2024 ten opzichte van dezelfde periode in 2019, waarbij het eerste kwartaal een toename van 18% liet zien en het tweede kwartaal een toename van 8%.
- Oudere leeftijdsgroepen bezochten aanzienlijk vaker de huisarts voor benaauwdheid dan jongere groepen.
- Vrouwen gingen iets vaker, maar de toename in consulten ten opzichte van 2019 is in 2024 sterker bij mannen.

Figuur 3 *Weekcijfers huisartsconsulten van benaauwdheid toegeschreven aan luchtwegen onder volwassenen (25 jaar en ouder).*



Over de surveillance van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De surveillance cijfers van Nivel Zorgregistraties zijn bedoeld voor de signalering van (infectie-) ziekten in de algemene bevolking, maar kunnen ook gebruikt worden voor de monitoring van plotselinge veranderingen in andere acute klachten. Er zijn wekelijkse cijfers beschikbaar over gezondheidsproblemen en aandoeningen in de Nederlandse bevolking op basis van – geanonimiseerde – gegevens uit elektronische medische dossiers van huisartsenpraktijken. De cijfers worden berekend als het aantal personen dat de huisarts in die week heeft geraadpleegd voor bepaalde gezondheidsproblemen of aandoeningen, gedeeld door het totaal aantal ingeschreven patiënten in de praktijk (cijfer van prevalentie van contact met de huisarts). De gegevens zijn afkomstig van ca. 400 deelnemende huisartsenpraktijken met ongeveer 1,7 miljoen ingeschreven patiënten (9% van de Nederlandse bevolking). De gegevens over de door huisartsen geregistreerde gezondheidsproblemen en aandoeningen worden routinematig vastgelegd gebruikmakend van de ICPC (International Classification of Primary Care, versie 1). Dit classificatiesysteem wordt in Nederland door alle huisartsen gebruikt.

Acute gezondheidsproblemen/condities die mogelijk (direct of indirect) gerelateerd zijn aan de coronapandemie, zoals gepresenteerd aan huisartsen, zijn in kaart gebracht. We richten ons op een aantal “niet-specifieke” gezondheidsproblemen die een fysieke en/of mentale oorzaak kunnen hebben (het gaat om zowel gezondheidsproblemen die zijn geregistreerd bij episodes van aandoeningen, als om gezondheidsproblemen die niet aan een aandoening worden toegeschreven). Een deel van deze gezondheidsproblemen wordt door het RIVM genoemd als mogelijke langdurige klachten na het doormaken van een infectie met het coronavirus. Een directe link is echter niet te maken: besmetting wordt niet geregistreerd in de data. Zie tabel 1 hierna voor de geïncludeerde gezondheidsproblemen en ICPC-codes.

Deze studie is goedgekeurd volgens de governance code van Nivel Zorgregistraties, onder nummer NZR-00322.009.

Meer weten?

Meer informatie over de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 is te vinden op

<https://www.nivel.nl/nl/project/integrale-gezondheidsmonitor-covid-19-gor-covid-fysieke-en-psychische-gezondheidseffecten>.

U vindt deze publicatie en alle andere Nivel-publicaties op www.nivel.nl/publicaties. Meer informatie over de surveillance staat op: www.nivel.nl/surveillance. Gegevens van Nivel Zorgregistraties zijn op aanvraag beschikbaar: www.nivel.nl/nl/informatie-over-het-aanvragen-van-gegevens-nivel.

Titelgegevens van deze publicatie

De gegevens uit deze publicatie mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt: Penders, J., Baliatsas, C., Hooiveld, M., Magnée, T., Penders, J., Dückers, M. & Bosmans, M. Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 9e gegevensrapportage volwassenen (jul-dec 2024). Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Utrecht: Nivel, 2025.

Tabel 1 Lijst met “niet-specifieke” gezondheidsproblemen en overeenkomende diagnosecodes (ICPC-1)

Gezondheidsprobleem	Diagnosecodes (ICPC naam)
Benauwd of kortademig in rust (zonder inspanning)*	R02 (Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen) R03 (Piepende ademhaling) R04 (Andere problemen ademhaling) R29 (Andere symptomen/klachten luchtwegen)
Moeheid*	A04 (Moeheid/zwakte)
Spierpijn*	L18 (Spierpijn)
Misselijkheid	D09 (Misselijkheid)
Pijn of druk op de borst*	K01 (Pijn toegeschreven aan hart) K02 (Druk/beklemming toegeschreven aan hart) K03 (Andere pijn toegeschreven aan hart vaatstelsel)
Hartkloppingen*	K04 (Hartkloppingen/bewust van hartslag)
Angstig/nervuus/gespannen gevoel	P01 (Angstig/nervuus/gespannen gevoel)
Plotselinge (hevige) stress of crisis	P02 (Crisis/voorbijgaande stressreactie)
Depressief gevoel*	P03 (Down/depressief gevoel)
Suicide(pogingen) en suïcidale gedachten	P77 (Suicide(poging))
Slaapproblemen	P06 (Slapeloosheid/andere slaapproblemen)
Hoofdpijn*	N01 (Hoofdpijn) N02 (Spanningshoofdpijn)
Duizeligheid of licht in het hoofd	N17 (Duizeligheid)
Geheugen- of concentratieproblemen*	P20 (Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen)
Andere afwijking(en) reuk/smaak*	N16 (Andere afwijking(en) reuk/smaak)


* Relevant voor “Long covid” volgens de RIVM-lijst: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/langdurige-klachten-na-corona>

Bijlage: Wekelijkse zorgprevalenties van contact met de huisarts voor gezondheidsproblemen en aandoeningen


Deze bijlage presenteert een overzicht van wekelijkse prevalenties van huisartscontacten voor diverse niet-specifieke gezondheidsproblemen en aandoeningen. De grafieken vergelijken gegevens van juli tot en met december 2024 met voorgaande jaren (2019, 2022, 2023), gedifferentieerd naar leeftijd, geslacht en provincie.

1.1 Ademhalingsproblemen


Figuur 1.1 Wekcijfers huisartsconsulten van benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Figuur 1.2 Weekcijfers huisartsconsulten van piepende ademhaling onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Figuur 1.3 Weekcijfers huisartsconsulten van andere problemen ademhaling onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Figuur 1.4 Wekcijfers huisartsconsulten van andere symptomen/klachten luchtwegen onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Figuur 1.5 Wekcijfers huisartsconsulten van dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.6 *Weekcijfers huisartsconsulten van piepende ademhaling onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).*




Figuur 1.7 *Weekcijfers huisartsconsulten van andere problemen ademhaling onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).*




Figuur 1.8 Weekcijfers huisartsconsulten van andere symptomen/klachten luchtwegen onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.9 Weekcijfers huisartsconsulten van dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen onder volwassenen, verdeeld over geslacht.




Figuur 1.10 Weekcijfers huisartsconsulten van piepende ademhaling onder volwassenen verdeeld over geslacht.



Figuur 1.11 Weekcijfers huisartsconsulten van andere problemen ademhaling onder volwassenen verdeeld over geslacht.




Figuur 1.12 Weekcijfers huisartsconsulten van andere symptomen/klachten luchtwegen onder volwassenen verdeeld over geslacht.




1.2 Moeheid


Figuur 1.13 Weekcijfers huisartsconsulten van moeheid onder volwassenen (25 jaar en ouder).



Figuur 1.14 Weekcijfers huisartsconsulten van moeheid onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.15 Weekcijfers huisartsconsulten van moeheid onder volwassenen, verdeeld over geslacht.




1.3 Spierpijn


Figuur 1.16 Weekcijfers huisartsconsulten van spierpijn onder volwassenen (25 jaar en ouder).



Figuur 1.17 Weekcijfers huisartsconsulten van spierpijn onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.18 Weekcijfers huisartsconsulten van spierpijn onder volwassenen verdeeld over geslacht.




1.4 Misselijkheid


Figuur 1.19 Weekcijfers huisartsconsulten van misselijkheid onder volwassenen (25 jaar en ouder).



Figuur 1.20 Weekcijfers huisartsconsulten van misselijkheid onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.21 Weekcijfers huisartsconsulten van misselijkheid onder volwassenen, verdeeld over geslacht.




1.5 Pijn of druk op de borst


Figuur 1.22 Weekcijfers huisartsconsulten van pijn toegeschreven aan hart onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Figuur 1.23 Weekcijfers huisartsconsulten van druk/beklemming toegeschreven aan hart onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Figuur 1.24 *Weekcijfers huisartsconsulten van andere pijn toegeschreven aan hart vaatstelsel onder volwassenen (25 jaar en ouder).*




Figuur 1.25 *Weekcijfers huisartsconsulten van pijn toegeschreven aan hart onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).*




Figuur 1.26 Weekcijfers huisartsconsulten druk/beklemming toegeschreven aan hart onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.27 Weekcijfers huisartsconsulten andere pijn toegeschreven aan hart vaatstelsel onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.28 Weekcijfers huisartsconsulten van pijn toegeschreven aan het hart onder volwassenen verdeeld over geslacht.



Figuur 1.29 Weekcijfers huisartsconsulten van druk/beklemming toegeschreven aan het hart onder volwassenen verdeeld over geslacht.




Figuur 1.30 Weekcijfers huisartsconsulten van andere pijn toegeschreven aan hart vaatstelsel onder volwassenen verdeeld over geslacht.




1.6 Hartkloppingen


Figuur 1.31 Weekcijfers huisartsconsulten van hartkloppingen onder volwassenen (25 jaar en ouder).



Figuur 1.32 Weekcijfers huisartsconsulten van hartkloppingen onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.33 Weekcijfers huisartsconsulten van hartkloppingen onder volwassenen verdeeld over geslacht.




1.7 Angstig, nerveus, gespannen


Figuur 1.34 Weekcijfers huisartsconsulten van angstige, nerveuze of gespannen gevoelens onder volwassenen (25 jaar en ouder).



Figuur 1.35 Weekcijfers huisartsconsulten van angstige, nerveuze of gespannen gevoelens onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.36 Weekcijfers huisartsconsulten van angstige, nerveuze of gespannen gevoelens onder volwassenen verdeeld over geslacht.




1.8 Plotselinge (hevige) stress of crisis


Figuur 1.37 Weekcijfers huisartsconsulten van plotselinge (hevige) stress of crisis onder volwassenen (25 jaar en ouder).



Figuur 1.38 Weekcijfers huisartsconsulten van plotselinge (hevige) stress of crisis onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.39 Weekcijfers huisartsconsulten van plotselinge (hevige) stress of crisis onder volwassenen verdeeld over geslacht.




1.9 Depressieve gevoelens


Figuur 1.40 Weekcijfers huisartsconsulten van depressieve gevoelens onder volwassenen (25 jaar en ouder).



Figuur 1.41 Weekcijfers huisartsconsulten van depressieve gevoelens onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.42 Weekcijfers huisartsconsulten van depressieve gevoelens onder volwassenen verdeeld over geslacht.




1.10 Suicide(pogingen/gedachten)


Figuur 1.43 Weekcijfers huisartsconsulten van suicide(pogingen/gedachten) onder volwassenen (25 jaar en ouder).



Figuur 1.44 Weekcijfers huisartsconsulten van suicide(pogingen/gedachten) onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.45 Weekcijfers huisartsconsulten van suicide(pogingen/gedachten) onder volwassenen, verdeeld over geslacht.




1.11 Slaapproblemen


Figuur 1.46 Weekcijfers huisartsconsulten van slapeloosheid/andere slaapproblemen onder volwassenen (25 jaar en ouder).



Figuur 1.47 Weekcijfers huisartsconsulten van slapeloosheid/andere slaapproblemen onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.48 Weekcijfers huisartsconsulten van slapeloosheid/andere slaapstoornissen onder volwassenen verdeeld over geslacht.




1.12 Hoofdpijn


Figuur 1.49 Weekcijfers huisartsconsulten van hoofdpijn onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Figuur 1.50 Weekcijfers huisartsconsulten van spanningshoofdpijn onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Figuur 1.51 *Weekcijfers huisartsconsulten van hoofdpijn onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).*




Figuur 1.52 *Weekcijfers huisartsconsulten van spanningshoofdpijn onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).*



Figuur 1.53 Weekcijfers huisartsconsulten van hoofdpijn onder volwassenen verdeeld over geslacht.




Figuur 1.54 Weekcijfers huisartsconsulten van spanningshoofdpijn onder volwassenen verdeeld over geslacht.




1.13 Duizeligheid of licht in het hoofd


Figuur 1.55 Weekcijfers huisartsconsulten van duizeligheid/licht in het hoofd onder volwassenen (25 jaar en ouder).



Figuur 1.56 Weekcijfers huisartsconsulten van duizeligheid/licht in het hoofd onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.57 Weekcijfers huisartsconsulten van duizeligheid/licht in het hoofd onder volwassenen verdeeld over geslacht.




1.14 Geheugen- of concentratieproblemen


Figuur 1.58 Weekcijfers huisartsconsulten van geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen onder volwassenen (25 jaar en ouder).



Figuur 1.59 Weekcijfers huisartsconsulten van geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.60 Weekcijfers huisartsconsulten van geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen onder volwassenen verdeeld over geslacht.




1.15 Afwijkingen in reuk of smaak


Figuur 1.61 Weekcijfers huisartsconsulten van andere afwijking(en) reuk/smaak onder volwassenen (25 jaar en ouder).



Figuur 1.62 Weekcijfers huisartsconsulten van andere afwijking(en) reuk/smaak onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Figuur 1.63 Weekcijfers huisartsconsulten van andere afwijking(en) reuk/smaak onder volwassenen verdeeld over geslacht.




Provinciale specificering wekelijkse zorgprevalenties van contact met de huisarts voor gezondheidsproblemen en aandoeningen


Figuur 1.64 Weekcijfers huisartsconsulten dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen per provincie.




Figuur 1.65 Weekcijfers huisartsconsulten piepende ademhaling per provincie.




Figuur 1.66 Weekcijfers huisartsconsulten andere problemen ademhaling per provincie.




Figuur 1.67 Weekcijfers huisartsconsulten andere symptomen/klachten luchtwegen per provincie.




Figuur 1.68 Weekcijfers huisartsconsulten moeheid naar provincie.




Figuur 1.69 Weekcijfers huisartsconsulten spierpijn per provincie.




Figuur 1.70 Weekcijfers huisartsconsulten misselijkheid naar provincie.




Figuur 1.71 Weekcijfers huisartsconsulten pijn toegeschreven aan het hart per provincie.




Figuur 1.72 Weekcijfers huisartsconsulten druk/beklemming toegeschreven aan het hart per provincie.




Figuur 1.73 Weekcijfers huisartsconsulten andere pijn toegeschreven aan hart vaatstelsel per provincie.




Figuur 1.74 Weekcijfers huisartsconsulten hartkloppingen per provincie.




Figuur 1.75 Weekcijfers huisartsconsulten angstige, nerveuze of gespannen gevoelens per provincie.




Figuur 1.76 Weekcijfers huisartsconsulten plotselinge (hevige) stress of crisis per provincie.




Figuur 1.77 Weekcijfers huisartsconsulten depressieve gevoelens per provincie.




Figuur 1.78 Weekcijfers huisartsenconsulten suicide (pogingen/gedachten) per provincie.




Figuur 1.79 Weekcijfers huisartsconsulten slaapproblemen per provincie.




Figuur 1.80 Weekcijfers huisartsconsulten hoofdpijn per provincie.




Figuur 1.81 Weekcijfers huisartsconsulten spanningshoofdpijn per provincie.



Figuur 1.82 Weekcijfers huisartsconsulten duizelig/licht in het hoofd per provincie.



Figuur 1.83 Weekcijfers huisartsconsulten geheugen- of concentratieproblemen per provincie.



Figuur 1.84 Weekcijfers huisartsconsulten afwijking(en) reuk/smaak per provincie.

