

Het aandeel van chronische zorg in de extramurale fysiotherapie

De huidige regering heeft het voornemen om de aanspraken op fysiotherapeutische zorg (verder) te beperken. Verschillende maatregelen worden daarbij overwogen. Een van de opties is om de fysiotherapeutische zorg voor niet-chronische aandoeningen¹ uit het basispakket te halen. Een variant op deze optie is om fysiotherapeutische zorg voor ouderen en kinderen wél in het basispakket te houden.

Op dit moment is onduidelijk wat de omvang van bovengenoemde optie zal zijn. Het NIVEL heeft daarom een analyse uitgevoerd op de LiPZ-gegevens om inzicht te krijgen in de verdeling van de fysiotherapeutische zorg over chronische aandoeningen versus niet-chronische aandoeningen en de verdeling van de fysiotherapeutische zorg over verschillende leeftijdscategorieën.

De huidige situatie is dat de aanspraken op fysiotherapie voor niet-chronische aandoeningen krachtens de Ziekenfondswet zijn beperkt tot 9 zittingen. Extra zittingen (boven de 9) worden in de regel vergoed door de aanvullende verzekering². De analyse is daarom uitgevoerd op het deelbestand van zittingen, verzameld in 2002, vergoed krachtens de Ziekenfondswet.³ De eenheid van analyse is de zitting (en niet de patiënt).

Verdeling van volume van fysiotherapeutische zorg (basispakket) naar chronisch/niet chronisch en naar leeftijd (LiPZ-gegevens)

In LiPZ worden gegevens verzameld van de 'algemeen praktiserende fysiotherapeut'. Uit Tabel 1 valt af te lezen dat het volume van fysiotherapeutische zorg van de algemeen practicus (basispakket) voor bijna 30% wordt besteed aan ouderen; kinderen (tot en met 18) nemen 3% voor hun rekening. Voor de populatie van algemeen practici geldt dat het percentage chronische zorg 41% bedraagt (met een betrouwbaarheidsinterval van 36 tot 46%). Er zijn echter wel verschillen tussen leeftijdsgroepen, met het oplopen van de leeftijd neemt het aandeel fysiotherapeutische zorg besteed aan chronische patiënten toe, boven de 65 jaar bedraagt dit aandeel 59%. Uit de gegevens van Tabel 1 kan berekend worden dat als alleen fysiotherapeutische zorg voor chronische patiënten in het basispakket blijft, 59% van de fysiotherapeutische zorg (algemeen practicus) uit het basispakket gaat verdwijnen. Indien kinderen en ouderen van deze maatregel uitgezonderd zouden worden is dit percentage lager, namelijk 45%.

Tabel 1: Proportie van volume chronische zorg (met betrouwbaarheidsinterval) naar leeftijdscategorie (algemeen practicus).

Leeftijd	proportie		% totale zorg
	chronisch zorg	Betrouwbaarheidsinterval	
0-18 jaar	0.26	0.15-0.38	3
19-44 jaar	0.26	0.22-0.30	33
45-64 jaar	0.41	0.35-0.47	35
>65 jaar	0.59	0.52-0.66	29
Totaal	0.41	0.36-0.46	100

Volume van zorg, uitgesplitst naar chronische en niet-chronische aandoeningen

Uit het linkergedeelte van Tabel 2 wordt duidelijk welke categorieën van patiënten door deze maatregel zouden worden getroffen, het betreft vooral patiënten verwezen naar fysiotherapie vanwege klachten van de wervelkolom. Uit het rechtergedeelte van de tabel valt af te leiden dat de fysiotherapeutische zorg voor chronische aandoeningen vooral besteed wordt aan patiënten met chronische (progressieve) aandoeningen zoals reumatoïde artritis, CVA en COPD.

¹ In deze rapportage wordt gemakshalve gesproken van chronische en niet-chronische aandoeningen. Met chronische aandoeningen wordt bedoeld aandoeningen die voorkomen op de zogenaamde 'VWS-Lijst aandoeningen langdurige en intermitterende fysiotherapie en oefentherapie.

² Ruim 90% van de ziekenfondsverzekerde patiënten is aanvullend verzekerd

³ Ongeveer 1 op de 5 zittingen wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed.

Tabel 2: Top-10 verwijsdiagnoses (in ICPC-codering) met het grootste volume van niet chronische zorg (linkerhelft van tabel) en chronische zorg (rechterhelft van tabel).

Top 10	Niet-Chronisch %	Proportie Chronisch	Top 10	Chronisch %	Proportie Chronisch
L03; Lage-rugpijn zonder uitstraling	16.16	0.08	L88; Reumatoïde artritis	9.35	0.97
L01; Nek symptomen/klachten	11.53	0.09	K90; Cerebrovasculaire accident (CVA)	8.82	0.94
L02; Rug symptomen/klachten	8.36	0.11	A89; Gevolgen operatie	8.82	0.93
L83; Syndroom cervicale wervelkolom	6.39	0.09	R95; Emfyseem/COPD	4.86	0.95
L08; Schouder symptomen/klachten	5.07	0.31	N87; Ziekte v. Parkinson	4.53	0.99
L99; Andere ziekten bewegingsapparaat	4.69	0.17	N99; Andere ziekten zenuwstelsel	3.89	0.96
L92; Schouder syndroom/PHS	4.14	0.30	L15; Knie symptomen/klachten	3.64	0.41
L15; Knie symptomen/klachten	3.62	0.41	L08; Schouder symptomen/klachten	3.33	0.31
L86; Lage-rugpijn met uitstraling	2.62	0.36	L76; Fracturen	3.25	0.77
L14; Been symptomen/klachten	2.60	0.19	N81; Letsel zenuwstelsel	2.76	0.98

Verdeling van volume van fysiotherapeutische zorg (basispakket) naar chronisch/niet chronisch en naar leeftijd geldend voor de totale populatie fysiotherapie (inclusief verbijzonderde fysiotherapie).

In LiPZ wordt de zorg geleverd door fysiotherapeuten met een verbijzondering niet geregistreerd. Dit betekent dat de zorg geleverd door verbijzonderde fysiotherapeuten is ondervertegenwoordigd. Om deze reden is een weging toegepast op de LiPZ-gegevens. Deze weging is gebaseerd op de gegevens gepresenteerd in het rapport Behoefteraming Fysiotherapeuten 2002 – 2015 (Vugts et al, 2003).

Weging

Uit de gegevens van de behoefte-raming blijkt dat een kleine tien procent van de totale extramurale fysiotherapeutische zorg geïnclassificeerd zou kunnen worden als ‘verbijzonderde’ fysiotherapeutische zorg (Tabel 3). Manueel therapeuten nemen daarvan het grootste deel voor hun rekening; 5% van de totale fysiotherapeutische zorg is manuele therapie. De gegevens van Tabel 3 zijn gebruikt om een weging op de LiPZ-gegevens toe te passen. Daarbij zijn de volgende aannamen gedaan: zorg door manueel- en sportfysiotherapeuten is niet-chronische zorg, kindersportfysiotherapie is voor 50% chronische zorg en lymfoedeem is exclusief chronische zorg. Ook voor de

verdeling over leeftijdscategorieën is een weging toegepast. Voor de manuele therapie en sportfysiotherapie is gebruik gemaakt van gegevens uit eerder onderzoek⁴, in geval van oedeemtherapie is de aanname gedaan dat driekwart van deze zorg geleverd wordt aan patiënten in de leeftijdscategorie 45 tot 64 jaar, de rest aan patiënten ouder dan 65 jaar.

Tabel 3: Aantal extramuraal werkende fysiotherapeuten, het percentage tijd besteed aan verbijzondering en een schatting van het percentage zittingen op jaarbasis

Fysiotherapie	abs	%	percentage besteed aan verbijzondering	percentage zittingen op jaarbasis
geriatrie	26	0.2%	-*	-
kinder	454	4.1%	71.0%	2.9%
manuele	1641	14.9%	33.5%	5.0%
sport	459	4.2%	20.1%	0.8%
oedeem	537	4.9%	17.6%	0.9%
Algemeen	7885	71.7%	-	90.4%

Bron: Behoefteraming Fysiotherapeuten NIVEL, 2003

* Van deze groep waren te weinig gegevens beschikbaar

In Tabel 4 is het resultaat van deze weging op de LiPZ-gegevens gepresenteerd. Uit de tabel blijkt dat het volume van zorg vergoed vanuit het basispakket geleverd door de totale extramurale populatie van fysiotherapeuten (dus inclusief verbijzonderde fysiotherapeuten) voor 39% bestaat uit zorg voor patiënten met chronische aandoeningen. In de leeftijdscategorie 19 tot 44 jaar wordt relatief het kleinste deel van de zorg besteed aan patiënten met chronische aandoeningen, namelijk 23%. Uit Tabel 4 kan afgeleid worden dat als alleen fysiotherapeutische zorg voor chronische patiënten in het basispakket blijft, 61% van de fysiotherapeutische zorg (inclusief verbijzonderingen) uit het basispakket gaat verdwijnen. Indien kinderen en ouderen van deze maatregel uitgezonderd zouden worden is dit percentage lager, namelijk 45%. Deze percentages verschillen overigens marginaal van de schattingen gedaan op basis van de ‘ruwe’ LiPZ-gegevens.

Tabel 4: Proportie van volume chronische zorg (met betrouwbaarheidsinterval) naar leeftijdscategorie (inclusief verbijzonderde fysiotherapie).

Leeftijd	proportie chronisch	Betrouwbaarheidsinterval	% totale zorg
0-18 jaar	0.36	0.23-0.49	6
19-44 jaar	0.23	0.20-0.27	33
45-64 jaar	0.40	0.34-0.46	34
>65 jaar	0.60	0.52-0.66	27
Totaal	0.39	0.34-0.44	100

⁴ Oostendorp, R.A.B. e.a., Ned. Tijds. v Fysiotherapie, 6, 112, 153-159, 2002.

Ooijendijk, W.T.M. e.a., Sportfysiotherapie in de praktijk, TNO/NIVEL-rapport, 2002.

Bijlage bij Factsheet-LiPZ

Het aandeel van chronische zorg in de fysiotherapie

Tabel 1: Volume van zittingen naar leeftijdscategorie uitgesplitst naar chronische zorg (lijstzittingen) en niet-chronische zorg (niet-lijstzittingen).

Leeftijd	Lijstzittingen (n=22.777)			Niet-lijstzittingen (n=32.946)			Totaal (n=55.723)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	26,5	1,9	0,8	73,5	3,0	2,2	100,0	3,0	3,0
19-24 jaar	35,3	3,4	1,4	64,7	4,3	2,5	100,0	3,9	3,9
25-34 jaar	27,7	8,7	3,5	72,3	15,7	9,3	100,0	12,8	12,8
35-44 jaar	22,6	9,0	3,7	77,4	21,4	12,6	100,0	16,3	16,3
45-54 jaar	34,5	15,5	6,4	65,5	20,4	12,1	100,0	18,4	18,4
55-64 jaar	47,8	19,1	7,8	52,2	14,4	8,5	100,0	16,3	16,3
65-74 jaar	53,0	17,0	6,9	47,0	10,4	6,2	100,0	13,1	13,1
> 75 jaar	64,4	25,4	10,4	35,6	9,7	5,7	100,0	16,1	16,1
Totaal	40,9	100,0	40,9	59,1	100,0	59,1	100,0	100,0	100,0

Bijlage: Het aandeel van chronische zorg in de fysiotherapie

Tabel 2: Top 10-verwijsdiagnoses met het grootste volume van chronische zorg (lijstzittingen) naar leeftijdscategorie. Percentages hebben betrekking op de top-10.

Leeftijd	Reumatoïde Artritis (n=2.129)			CVA (n=2.010)			Gevolgen operatie (n=2.008)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	14,8	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19-24 jaar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25-34 jaar	8,6	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0	3,7	0,9	0,1
35-44 jaar	19,8	8,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,0
45-54 jaar	20,8	14,3	2,5	10,2	7,4	1,2	18,7	13,7	2,3
55-64 jaar	21,1	27,3	4,8	14,7	20,2	3,4	17,1	23,5	3,9
65-74 jaar	14,6	14,8	2,6	17,1	18,3	3,0	29,9	32,1	5,3
> 75 jaar	17,8	32,6	5,7	27,8	54,1	9,0	15,2	29,7	4,9
Totaal	17,6	100,0	17,6	16,6	100,0	16,6	16,6	100,0	16,6

Leeftijd	Emfyseem/ COPD (n=1.106)			Parkinsonisme (n=1.031)			Andere ziekten zenuwstelsel (n=886)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	3,8	0,3
19-24 jaar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9	22,6	1,7
25-34 jaar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	16,8	1,2
35-44 jaar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	13,8	1,0
45-54 jaar	13,4	17,8	1,6	5,2	7,4	0,6	4,0	6,6	0,5
55-64 jaar	7,4	18,4	1,7	4,2	11,3	1,0	10,5	32,7	2,4
65-74 jaar	16,9	32,8	3,0	13,4	28,0	2,4	0,0	0,0	0,0
> 75 jaar	8,8	31,0	2,8	14,1	53,4	4,5	0,8	3,7	0,3
Totaal	9,1	100,0	9,1	8,5	100,0	8,5	7,3	100,0	7,3

Leeftijd	Knie symptomen/ klachten (n=829)			Schouder symptomen/ klachten (n=758)			Andere fracturen (n=740)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	0,0	0,0	0,0	17,3	1,9	0,1	25,9	2,8	0,2
19-24 jaar	46,1	20,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25-34 jaar	9,9	5,4	0,4	16,5	9,9	0,6	12,3	7,6	0,5
35-44 jaar	24,2	26,7	1,8	16,5	19,9	1,3	9,9	12,2	0,7
45-54 jaar	13,9	24,6	1,7	12,1	23,5	1,5	0,0	0,0	0,0
55-64 jaar	2,1	7,0	0,5	8,7	31,7	2,0	4,4	16,5	1,0
65-74 jaar	4,5	11,7	0,8	1,0	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0
> 75 jaar	0,8	4,0	0,3	2,0	10,4	0,7	11,5	61,0	3,7
Totaal	6,8	100,0	6,8	6,3	100,0	6,3	6,1	100,0	6,1

Leeftijd	Letsel zenuwstelsel (n=628)		
	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	25,0	4,3	0,2
19-24 jaar	20,7	15,5	0,8
25-34 jaar	17,7	13,1	0,7
35-44 jaar	5,1	6,5	0,3
45-54 jaar	8,3	20,7	1,1
55-64 jaar	6,3	26,4	1,4
65-74 jaar	0,0	0,0	0,0
> 75 jaar	2,2	13,5	0,7
Totaal	5,2	100,0	5,2

Tabel 3: Top 10-verwijsdiagnoses met het grootste volume van niet-chronische zorg (niet-lijstzittingen) naar leeftijdscategorie. Percentages hebben betrekking op de top-10.

Leeftijd	Lage rugpijn zonder uitstraling (n=5.324)			Nek symptomen/ klachten (n=3.798)			Rug symptomen/ klachten (n=2.753)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	10,4	1,1	0,3	9,3	1,3	0,2	16,0	3,2	0,4
19-24 jaar	30,3	5,1	1,3	19,0	4,5	0,8	16,2	5,3	0,7
25-34 jaar	27,0	17,8	4,4	19,0	17,5	3,1	16,8	21,3	2,7
35-44 jaar	23,8	22,0	5,5	19,6	25,3	4,5	12,2	21,8	2,8
45-54 jaar	25,1	21,9	5,4	16,4	20,0	3,5	10,0	16,9	2,2
55-64 jaar	25,1	15,1	3,7	16,7	14,1	2,5	13,0	15,1	1,9
65-74 jaar	24,2	9,6	2,4	15,6	8,7	1,5	12,8	9,8	1,3
> 75 jaar	24,0	7,4	1,8	19,8	8,6	1,5	11,1	6,6	0,8
Totaal	24,8	100,0	24,8	17,7	100,0	17,7	12,8	100,0	12,8

Leeftijd	Syndromen cervicale wervelkolom (n=2.105)			Schouder symptomen/ klachten (n=1.671)			Andere ziekten bewegingsapparaat (n=1.545)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	5,3	1,4	0,1	2,7	0,9	0,1	24,5	8,7	0,6
19-24 jaar	8,1	3,5	0,3	5,7	3,1	0,2	7,2	4,2	0,3
25-34 jaar	9,0	15,0	1,5	5,2	10,9	0,8	7,5	16,9	1,2
35-44 jaar	9,2	21,6	2,1	8,6	25,4	2,0	6,4	20,3	1,5
45-54 jaar	12,7	28,1	2,8	8,4	23,3	1,8	7,4	22,3	1,6
55-64 jaar	11,4	17,3	1,7	8,2	15,7	1,2	7,0	14,4	1,0
65-74 jaar	9,4	9,5	0,9	9,5	12,0	0,9	5,8	7,9	0,6
> 75 jaar	4,7	3,7	0,4	8,8	8,7	0,7	4,9	5,2	0,4
Totaal	9,8	100,0	9,8	7,8	100,0	7,8	7,2	100,0	7,2

Leeftijd	Schoudersyndromen/ PHS (n=1.365)			Knie symptomen/ klachten (n=1.192)			Lage rugpijn met uitstraling (n=862)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	1,1	0,4	0,0	21,8	10,1	0,6	0,0	0,0	0,0
19-24 jaar	5,5	3,6	0,2	4,6	3,4	0,2	0,1	0,1	0,0
25-34 jaar	4,2	10,8	0,7	3,9	11,4	0,6	4,1	16,5	0,7
35-44 jaar	5,6	20,2	1,3	7,1	29,3	1,6	3,6	20,6	0,8
45-54 jaar	6,5	22,2	1,4	3,7	14,3	0,8	4,7	25,2	1,0
55-64 jaar	6,7	15,8	1,0	6,7	18,1	1,0	4,1	15,1	0,6
65-74 jaar	10,1	15,8	1,0	4,2	7,5	0,4	4,5	11,1	0,4
> 75 jaar	9,4	11,3	0,7	4,3	6,0	0,3	6,0	11,4	0,5
Totaal	6,4	100,0	6,4	5,6	100,0	5,6	4,0	100,0	4,0

Leeftijd	Been/dijbeen symptomen/ klachten (n=858)		
	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	8,9	5,7	0,2
19-24 jaar	3,3	3,5	0,1
25-34 jaar	3,4	13,8	0,5
35-44 jaar	3,9	22,1	0,9
45-54 jaar	5,0	27,3	1,1
55-64 jaar	1,2	4,7	0,2
65-74 jaar	3,9	9,6	0,4
> 75 jaar	7,0	13,4	0,5
Totaal	4,0	100,0	4,0

Tabel 4: Top 10-verwijsdiagnoses met het grootste volume van zorg (chronische en niet-chronische zorg) naar leeftijdscategorie. Percentage hebben betrekking op de top-10.

Leeftijd	Lage rugpijn zonder uitstraling (n=5.765)			Nek symptomen/ klachten (n=4.140)			Rug symptomen/ klachten (n=3.056)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	17,4	1,3	0,3	12,7	1,3	0,2	24,5	3,5	0,4
19-24 jaar	27,8	4,7	1,0	17,4	4,1	0,6	14,8	4,7	0,5
25-34 jaar	29,5	17,2	3,5	22,9	18,6	2,7	18,2	20,1	2,2
35-44 jaar	25,8	22,7	4,7	19,8	24,2	3,6	11,9	19,7	2,1
45-54 jaar	23,3	22,2	4,6	15,8	21,0	3,1	11,7	21,0	2,3
55-64 jaar	16,5	13,9	2,9	11,5	13,5	2,0	10,1	16,2	1,8
65-74 jaar	17,2	11,0	2,3	10,4	9,3	1,4	7,3	8,9	1,0
> 75 jaar	9,6	6,9	1,4	7,8	7,9	1,2	4,4	6,0	0,6
Totaal	20,5	100,0	20,5	14,7	100,0	14,7	10,9	100,0	10,9

Leeftijd	Schouder symptomen/ klachten (n=2.429)			Syndromen cervicale wervelkolom (n=2.279)			Reumatoïde artritis (n=2.195)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	6,7	1,2	0,1	6,7	1,3	0,1	2,8	0,5	0,0
19-24 jaar	5,2	2,1	0,2	7,5	3,2	0,3	0,0	0,0	0,0
25-34 jaar	7,6	10,6	0,9	9,6	14,2	1,2	1,2	1,8	0,1
35-44 jaar	11,3	23,7	2,0	9,4	20,9	1,7	3,7	8,7	0,7
45-54 jaar	10,3	23,4	2,0	11,6	28,0	2,3	5,8	14,6	1,1
55-64 jaar	10,3	20,7	1,8	8,3	17,8	1,4	12,6	28,1	2,2
65-74 jaar	6,0	9,1	0,8	5,4	8,8	0,7	8,7	14,7	1,1
> 75 jaar	5,4	9,2	0,8	3,2	5,9	0,5	16,7	31,7	2,5
Totaal	8,7	100,0	8,7	8,1	100,0	8,1	7,8	100,0	7,8

Leeftijd	Gevolgen operatie (n=2.169)			CVA (n=2.130)			Knie symptomen/ klachten (n=2.021)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	5,9	0,4
19-24 jaar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	10,5	0,8
25-34 jaar	0,5	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	5,4	9,0	0,6
35-44 jaar	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	28,2	2,0
45-54 jaar	5,3	13,5	1,0	3,0	7,7	0,6	6,8	18,5	1,3
55-64 jaar	10,4	23,5	1,8	8,9	20,3	1,5	5,6	13,6	1,0
65-74 jaar	18,3	31,2	2,4	9,9	17,3	1,3	5,0	9,2	0,7
> 75 jaar	16,1	30,8	2,4	28,0	54,7	4,1	2,5	5,1	0,4
Totaal	7,7	100,0	7,7	7,6	100,0	7,6	7,2	100,0	7,2

Leeftijd	Schouder syndromen/ PHS (n=1.894)		
	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	1,4	0,3	0,0
19-24 jaar	5,5	2,9	0,2
25-34 jaar	5,0	8,9	0,6
35-44 jaar	6,7	18,0	1,2
45-54 jaar	6,4	18,5	1,2
55-64 jaar	5,8	14,9	1,0
65-74 jaar	11,7	22,9	1,5
> 75 jaar	6,2	13,7	0,9
Totaal	6,7	100,0	6,7

Tabel 5: Declaraties fysiotherapie uitgesplitst naar chronische en niet chronische zorg (lijst en niet-lijst) naar soort declaratie.

	Lijst		niet-Lijst		Totaal
	%	Tabel %	%	Tabel %	
Reguliere zitting fysiotherapie	60.68	24.80	92.84	54.89	79.69
Fysiotherapie incl.toeslag behandeling aan huis	28.50	11.65	4.97	2.94	14.59
Fysiotherapie incl. inrichtingstoeslag	9.53	3.90	2.05	1.21	5.11
Groepsbehandeling fysiotherapie	1.29	0.53	0.14	0.08	0.61

Bijlage: Het aandeel van chronische zorg in de fysiotherapie

Tabel 6: Top 10-verwijsdiagnoses met het grootste volume van chronische zorg (lijstzittingen) naar leeftijdscategorie. Percentages hebben betrekking op de totale omvang van chronische zorg.

Leeftijd	Reumatoïde Artritis (n=2.129)			CVA (n=2.010)			Gevolgen operatie (n=2.008)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	2,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19-24 jaar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25-34 jaar	2,0	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	0,1
35-44 jaar	8,8	8,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
45-54 jaar	8,6	14,3	1,3	4,2	7,4	0,7	7,7	13,6	1,2
55-64 jaar	13,4	27,3	2,6	9,3	20,2	1,8	10,8	23,5	2,1
65-74 jaar	8,2	14,8	1,4	9,5	18,3	1,6	16,7	32,1	2,8
> 75 jaar	12,0	32,6	3,1	18,8	54,1	4,8	10,3	29,7	2,6
Totaal	9,3	100,0	9,3	8,8	100,0	8,8	8,8	100,0	8,8

Leeftijd	Emfyseem/ COPD (n=1.106)			Parkinsonisme (n=1.031)			Andere ziekten zenuwstelsel (n=886)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	3,8	0,1
19-24 jaar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	22,6	0,9
25-34 jaar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	16,8	0,7
35-44 jaar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	13,8	0,5
45-54 jaar	5,6	17,8	0,9	2,1	7,4	0,3	1,6	6,6	0,3
55-64 jaar	4,7	18,4	0,9	2,7	11,3	0,5	6,7	32,7	1,3
65-74 jaar	9,4	32,8	1,6	7,5	28,0	1,3	0,0	0,0	0,0
> 75 jaar	5,9	31,0	1,5	9,5	53,4	2,4	0,6	3,7	0,1
Totaal	4,9	100,0	4,9	4,5	100,0	4,5	3,9	100,0	3,9

Leeftijd	Knie symptomen/ klachten (n=829)			Schouder symptomen/ klachten (n=758)			Andere fracturen (n=740)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	0,0	0,0	0,0	3,2	1,9	0,1	4,8	2,8	0,1
19-24 jaar	22,3	20,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25-34 jaar	2,3	5,4	0,2	3,8	9,9	0,3	2,8	7,6	0,2
35-44 jaar	10,8	26,7	1,0	7,4	19,9	0,7	4,4	12,2	0,4
45-54 jaar	5,8	24,6	0,9	5,0	23,5	0,8	0,0	0,0	0,0
55-64 jaar	1,3	7,0	0,3	5,5	31,7	1,1	2,8	16,5	0,5
65-74 jaar	2,5	11,7	0,4	0,5	2,8	0,1	0,0	0,0	0,0
> 75 jaar	0,6	4,0	0,1	1,4	10,4	0,3	7,8	61,0	2,0
Totaal	3,6	100,0	3,6	3,3	100,0	3,3	3,2	100,0	3,2

Leeftijd	Letsel zenuwstelsel (n=628)		
	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	6,1	4,3	0,1
19-24 jaar	12,6	15,5	0,4
25-34 jaar	4,1	13,1	0,4
35-44 jaar	2,0	6,5	0,2
45-54 jaar	3,7	20,7	0,6
55-64 jaar	3,8	26,4	0,7
65-74 jaar	0,0	0,0	0,0
> 75 jaar	1,5	13,5	0,4
Totaal	2,8	100,0	2,8

Bijlage: Het aandeel van chronische zorg in de fysiotherapie

Tabel 7: Top 10-verwijsdiagnoses met het grootste volume van niet-chronische zorg (niet-lijstzittingen) naar leeftijdscategorie. Percentages hebben betrekking op de totale omvang van niet-chronische zorg.

Leeftijd	Lage rugpijn zonder uitstraling (n=5.324)			Nek symptomen/ klachten (n=3.798)			Rug symptomen/ klachten (n=2.753)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	4,6	1,1	0,2	4,2	1,3	0,2	7,2	3,2	0,3
19-24 jaar	19,3	5,1	0,8	12,1	4,5	0,5	10,3	5,3	0,4
25-34 jaar	18,3	17,8	2,9	12,8	17,5	2,0	11,3	21,3	1,8
35-44 jaar	16,6	22,0	3,6	13,7	25,3	2,9	8,5	21,8	1,8
45-54 jaar	17,4	21,9	3,5	11,3	20,0	2,3	6,9	16,9	1,4
55-64 jaar	16,9	15,1	2,4	11,2	14,1	1,6	8,8	15,1	1,3
65-74 jaar	14,9	9,6	1,6	9,6	8,7	1,0	7,9	9,8	0,8
> 75 jaar	12,3	7,4	1,2	10,2	8,6	1,0	5,7	6,6	0,6
Totaal	16,2	100,0	16,2	11,5	100,0	11,5	8,4	100,0	8,4

Leeftijd	Syndromen cervicale wervelkolom (n=2.105)			Schouder symptomen/ klachten (n=1.671)			Andere ziekten bewegingsapparaat (n=1.545)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	2,4	1,4	0,1	1,2	0,9	0,0	11,0	8,7	0,4
19-24 jaar	5,2	3,5	0,2	3,6	3,1	0,2	4,6	4,2	0,2
25-34 jaar	6,1	15,0	1,0	3,5	10,9	0,6	5,0	16,9	0,8
35-44 jaar	6,5	21,6	1,4	6,0	25,4	1,3	4,5	20,3	1,0
45-54 jaar	8,8	28,1	1,8	5,8	23,3	1,2	5,1	22,3	1,0
55-64 jaar	7,7	17,3	1,1	5,5	15,7	0,8	4,7	14,4	0,7
65-74 jaar	5,8	9,5	0,6	5,9	12,0	0,6	3,6	7,9	0,4
> 75 jaar	2,4	3,7	0,2	4,5	8,7	0,4	2,5	5,2	0,2
Totaal	6,4	100,0	6,4	5,1	100,0	5,1	4,7	100,0	4,7

Leeftijd	Schoudersyndromen/ PHS (n=1.365)			Knie symptomen/ klachten (n=1.192)			Lage rugpijn met uitstraling (n=862)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	0,5	0,4	0,0	9,8	10,1	0,4	0,0	0,0	0,0
19-24 jaar	3,5	3,6	0,1	2,9	3,4	0,1	0,1	0,1	0,0
25-34 jaar	2,8	10,8	0,4	2,6	11,4	0,4	2,7	16,5	0,4
35-44 jaar	3,9	20,2	0,8	5,0	29,3	1,1	2,5	20,6	0,5
45-54 jaar	4,5	22,2	0,9	2,5	14,3	0,5	3,2	25,2	0,7
55-64 jaar	4,5	15,8	0,7	4,5	18,1	0,7	2,7	15,1	0,4
65-74 jaar	6,3	15,8	0,7	2,6	7,5	0,3	2,8	11,1	0,3
> 75 jaar	4,8	11,3	0,5	2,2	6,0	0,2	3,1	11,4	0,3
Totaal	4,1	100,0	4,1	3,6	100,0	3,6	2,6	100,0	2,6

Leeftijd	Been/dijbeen symptomen/ klachten (n=858)		
	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	4,0	5,7	0,1
19-24 jaar	2,1	3,5	0,1
25-34 jaar	2,3	13,8	0,4
35-44 jaar	2,7	22,1	0,6
45-54 jaar	3,5	27,3	0,7
55-64 jaar	0,8	4,7	0,1
65-74 jaar	2,4	9,6	0,2
> 75 jaar	3,6	13,4	0,3
Totaal	2,6	100,0	2,6

Bijlage: Het aandeel van chronische zorg in de fysiotherapie

Tabel 8: Top 10-verwijsdiagnoses met het grootste volume van zorg (chronische en niet-chronische zorg) naar leeftijdscategorie. Percentages hebben betrekking op de totale omvang van de zorg.

Leeftijd	Lage rugpijn zonder uitstraling (n=5.765)			Nek symptomen/ klachten (n=4.140)			Rug symptomen/ klachten (n=3.056)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	4,5	1,3	0,1	3,3	1,3	0,1	6,3	3,5	0,2
19-24 jaar	12,5	4,7	0,5	7,8	4,1	0,3	6,7	4,7	0,3
25-34 jaar	13,9	17,2	1,8	10,8	18,6	1,4	8,6	20,1	1,1
35-44 jaar	14,4	22,7	2,3	11,0	24,2	1,8	6,6	19,7	1,1
45-54 jaar	12,5	22,2	2,3	8,5	21,0	1,6	6,3	21,0	1,2
55-64 jaar	8,8	13,9	1,4	6,1	13,5	1,0	5,4	16,2	0,9
65-74 jaar	8,7	11,0	1,1	5,3	9,3	0,7	3,7	8,9	0,5
> 75 jaar	4,4	6,9	0,7	3,6	7,9	0,6	2,0	6,0	0,3
Totaal	10,3	100,0	10,3	7,4	100,0	7,4	5,5	100,0	5,5

Leeftijd	Schouder symptomen/ klachten (n=2.429)			Syndromen cervicale wervelkolom (n=2.279)			Reumatoïde artritis (n=2.195)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	1,7	1,2	0,1	1,7	1,3	0,1	0,7	0,5	0,0
19-24 jaar	2,3	2,1	0,1	3,4	3,2	0,1	0,0	0,0	0,0
25-34 jaar	3,6	10,6	0,5	4,5	14,2	0,6	0,5	1,8	0,1
35-44 jaar	6,3	23,7	1,0	5,2	20,9	0,9	2,1	8,7	0,3
45-54 jaar	5,5	23,4	1,0	6,2	28,0	1,1	3,1	14,6	0,6
55-64 jaar	5,5	20,7	0,9	4,4	17,8	0,7	6,8	28,1	1,1
65-74 jaar	3,0	9,1	0,4	2,7	8,8	0,4	4,4	14,7	0,6
> 75 jaar	2,5	9,2	0,4	1,5	5,9	0,2	7,8	31,7	1,2
Totaal	4,4	100,0	4,4	4,1	100,0	4,1	3,9	100,0	3,9

Leeftijd	Gevolgen operatie (n=2.169)			CVA (n=2.130)			Knie symptomen/ klachten (n=2.021)		
	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	5,9	0,2
19-24 jaar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	10,5	0,4
25-34 jaar	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	9,0	0,3
35-44 jaar	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	28,2	1,0
45-54 jaar	2,8	13,5	0,5	1,6	7,7	0,3	3,6	18,5	0,7
55-64 jaar	5,6	23,5	0,9	4,8	20,3	0,8	3,0	13,6	0,5
65-74 jaar	9,3	31,2	1,2	5,0	17,3	0,7	2,5	9,2	0,3
> 75 jaar	7,5	30,8	1,2	13,0	54,7	2,1	1,2	5,1	0,2
Totaal	3,9	100,0	3,9	3,8	100,0	3,8	3,6	100,0	3,6

Leeftijd	Schouder syndromen/ PHS (n=1.894)		
	% rij	% kolom	% totaal
0-18 jaar	0,4	0,3	0,0
19-24 jaar	2,5	2,9	0,1
25-34 jaar	2,3	8,9	0,3
35-44 jaar	3,7	18,0	0,6
45-54 jaar	3,4	18,5	0,6
55-64 jaar	3,1	14,9	0,5
65-74 jaar	5,9	22,9	0,8
> 75 jaar	2,9	13,7	0,5
Totaal	3,4	100,0	3,4